

PICC 导管与一次性静脉留置针临床应用效果探讨

彭 雨

华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院, 湖北 武汉 430014

摘要: 目的 研究 PICC 导管与一次性静脉留置针的临床应用效果。方法 对象为 100 例肾内科收治需实施静脉输液的患者, 患者就诊时间段为 2017 年 12 月到 2019 年 12 月期间, 将其中接受一次性静脉留置针输液的 50 例患者设为对照组, 将另外 50 例接受 PICC 导管输液的患者纳入观察组。对比两组肾内科患者接受不同静脉输液方式后的不良反应发生率。结果 观察组静脉输液患者的不良反应发生率为 4% 明显低于对照组输液患者的不良反应发生率 22%, 两组肾内科静脉输液患者的临床应用效果差异存在统计学意义, $P < 0.05$ 。结论 与一次性静脉留置针相比, PICC 导管的应用价值更高, 导管留置时间更长, 不良反应发生率非常低, 不会给患者带来痛苦, 具有积极的推广价值。

关键词: PICC 导管; 一次性静脉留置针; 不良反应

PICC 导管全称为经外周静脉插管中心静脉导管。伴随着我国医疗水平的提升, 临床上 PICC 导管的应用越来越广泛, 但是部分临床仍然使用的是一次性静脉留置针的输液方式, 这种输液方法与 PICC 导管相比, 会给患者的血管壁造成较大的损伤, 很容易引发静脉炎、血栓等不良情况^[1]。而 PICC 导管是通过在静脉输液的过程中, 将导管末端与输液器接头连接起来, 操作性更简单, 不仅省时省力, 还能够降低针头脱落情况, 重复输液但不会给患者带来痛苦。所以, 本文以 100 例肾内科收治需实施静脉输液的患者, 患者就诊时间段为 2017 年 12 月到 2019 年 12 月期间, 对 PICC 导管与一次性静脉留置针的应用效果进行探讨。整理的具体报告如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

对象为 100 例肾内科收治需实施静脉输液的患者, 患者就诊时间段为 2017 年 12 月到 2019 年 12 月期间, 将其中接受一次性静脉留置针输液的 50 例患者设为对照组, 将另外 50 例接受 PICC 导管输液的患者纳入观察组。对照组中男性 26 例, 女性 24 例, 年龄最小的 14 岁, 最大的 85 岁, 平均年龄 (65.4 ± 3.7) 岁; 观察组男性 28 例, 女性 22 例, 年龄最小的 10 岁, 最大的 82 岁, 平均年龄 (62.4 ± 3.5) 岁。两组静脉输液患者一般资料纳入软件 SPSS17.0 系统发现 $P > 0.05$, 无差异可对比。

1.2 护理方法

给予对照组 50 例静脉输液患者使用一次性静脉留置针, 选择血管时, 尽可能选择较粗、弹性较好、直的静脉血管, 先扎好止血带, 在穿刺部位消毒, 以 30° 角度进针, 出现回血后进针 2mm, 将针芯固定好, 并解开止血带, 用敷贴固定。

给予 50 例静脉输液患者使用 PICC 导管。首先, 患者保持仰卧位, 选择合适的静脉, 叮嘱患者保持仰卧位, 将接受穿刺的上肢向外展开 90° , 确定穿刺点, 对穿刺部位进行消毒, 消毒范围需要超过直径 20cm。将导管和注射器接头注满生理盐水, 将导管末端和生理盐水注射器连接起来, 使用 PICC 导管自带穿刺针进行静脉穿刺, 确定针孔完全进入静脉后, 将针头固定, 缓慢向内送管, 到达第一个测量长度后, 叮嘱患者向穿刺一侧缓慢转动头部, 尽可能靠近锁骨, 送管的过程中观察回血情况, 到达制定位置后, 将穿刺针退出, 按压穿刺点, 将注射器接头取下, 用敷贴固定穿刺点的导管, 结束后用含有 5U 肝素的生理盐水进行封管。

1.3 观察指标

两组静脉输液患者接受了不同的输液方式后, 统计接下来治疗过程中不良反应发生情况, 具体症状包括穿刺点肿胀、静脉炎、血栓。

1.4 统计学方法

所有数据均纳入到 SPSS17.0 的 Excel 表中, 进行对比和检验值计算, 卡方主要是用于检验和计算患者计数资料之间的数据差异, 如性别、百分比等, 平均年龄、病程数据比较采用平均数 ± 标准差表示行 t 检验, 当 $P < 0.05$ 为比较差异具有统计学意义。

2 结果

观察组静脉输液患者的不良反应发生率为 4% 明显低于对照组输液患者的不良反应发生率 22%, 两组肾内科静脉输液患者的临床应用效果差异存在统计学意义, $P < 0.05$ 。

表 1 两组静脉输液患者不良反应发生率对比

组别	穿刺点肿胀	静脉炎	血栓	总发生率
对照组 (n=50)	4 (8.0)	4 (8.0)	3 (6.0)	11 (22.0)
观察组 (n=50)	1 (2.0)	1 (2.0)	0 (0.0)	2 (4.0)
χ^2				1.3025
P				<0.05

3 讨论

通过临床累积的经验发现, PICC 导管的留置时间可以达到 3 个月, 最常可达到 1 年, 接受这种静脉注射方式的患者, 仅仅需要接受一次静脉穿刺即可, 后续的静脉输液治疗都不会出现穿刺疼痛, 真正实现了无痛技术^[2]。PICC 置管在危重症病人中能够充分发挥出应用价值, 因此危重症病人需要长期接受输液, 若经常进行穿刺, 很容易对静脉血管造成损伤, 引发局部感染的情况。部分医院同时在使用一次性静脉留置针, 但是这种留置针由于套管比较短, 患者进行活动时可能会导致套管脱落或者静脉炎, 如果将留置针放在肘部也会造成患者的不适, 因此不推荐使用^[3]。

综上所述, 与一次性静脉留置针相比, PICC 导管的应用价值更高, 导管留置时间更长, 不良反应发生率非常低, 不会给患者带来痛苦, 具有积极的推广价值。

参考文献

- [1] 陈海静. 浅谈临床应用静脉留置针后出现并发症的原因与护理对策 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2019, 19(A3): 306-307.
- [2] 张静. PICC 导管与前臂静脉留置针在化疗中的效果比较 [J]. 中国医疗器械信息, 2019, 25(23): 170-171.
- [3] 崔丽娜, 薛萍, 李阅, 张馨, 张莹. 3 种静脉输液途径在乳腺癌化疗中的应用 [J]. 护理研究, 2015, 29(15): 1875-1877.