

眼科护理中不安全因素的分析与防范措施

郭晓洁

四川省绵阳市万江眼科医院, 中国·四川 绵阳 621000

【摘要】目的: 针对眼科护理实践中所涉及的不安全因素进行分析和探究, 并提出相对应的防范措施。方法: 选取在2018年4月到2019年6月这个阶段内接收的眼科疾病患者90例作为研究对象, 针对所有研究对象进行随机分组, 分成对照组和观察组, 各45例患者, 其中针对对照组实施常规护理模式, 而针对观察组而言, 是以对照组为基础进一步加之针对性护理管理模式, 对护理实践中的不安全因素进行全面分析和探究, 切实采取更科学合理的防范措施。结果: 在眼科护理管理过程中所涉及的不安全因素主要包括护理人员因素, 患者因素以及护理管理操作以及相应规范因素等。其中, 观察组患者的护理效果以及护理风险事件发生几率等相关指标, 要十分显著的优于对照组, $p < 0.05$ 。结论: 在眼科护理实践中, 要着重针对护理实践中的不安全因素进行全面深入的分析, 以此为基准采取更科学合理的针对性护理防范措施, 做好风险评估和健康教育工作, 这样可充分确保眼科护理质量和护理满意程度得到全面提升, 有效降低护理风险发生几率。

【关键词】眼科护理; 不安全因素; 防范措施

针对眼科疾病患者而言, 要着重做好风险防范护理工作, 有针对性的分析和探讨护理实践中的不安全因素, 并采取护理风险管理措施, 切实有效的推进针对性防范策略, 这样可以充分确保护理质量和患者护理满意程度充分提升。针对这样的情况, 本次研究着重选取我院在2018年4月到2019年6月这个阶段内接收的眼科疾病患者90例作为研究对象, 针对眼科护理实践中所涉及的不安全因素进行分析和探究, 并提出相对应的防范措施。现在针对具体内容进行总结分析如下。

1 资料及方法

1.1 一般资料

着重选取我院在2018年4月到2019年6月这个阶段内接收的眼科疾病患者进行深入细致的分析和研究, 对其随机分成对照组和观察组, 每组有患者45例。患者中包括男性40例, 女性50例, 年龄范围在35~83岁, 平均年龄是63.25岁。两组患者的一般资料进行比较, 没有明显的统计学差异, $p > 0.05$, 有可比性。

1.2 方法

针对对照组实施常规护理模式, 而针对观察组而言, 是以对照组为基础进一步加之针对性护理管理模式, 着重针对眼科疾病的并发症进行分析, 并探究护理不良事件的发生特点等相关情况, 评价不安全因素。在整个过程中要组建高素质的护理管理小组, 进行集中的探讨和分析, 并试制定相对应的防范措施, 结合风险发生可能性的大小有效执行相对应的风险防范策略。

1.3 观察标准

两组患者实施完相对应的护理模式之后, 对其眼部护理效果以及风险事件发生几率进行分析和对比。

1.4 统计学方法

数据采用SPSS 24.0统计软件进行分析, 计量资料以均数 \pm 标准差($\bar{x} \pm s$)表示, 采用t检验, $P < 0.05$ 代表对照组和观察组的组间比较有相应的统计学意义。

2 结果

通过对比分析能够充分看出, 在眼科护理管理过程中所涉及的不安全因素主要包括护理人员因素, 患者因素以及护理管理操作以及相应规范因素等。其中, 观察组患者的护理效果以及护理风险事件发生几率等相关指标, 要十分显著的优于对照组, 组间比较差异显著, 有统计学意义, $p < 0.05$ 。

3 讨论

3.1 眼科护理中的不安全因素

3.1.1 眼科专业特点风险因素

眼病有着很大的特殊性和高危性, 如果没有进行切实有效的护理和愈后, 对患者生活质量会造成严重影响。

3.1.2 护理人员风险

护士在数量和质量方面不足, 缺乏应有的人员储备, 护士的专业技能, 职业素养和综合素质等方面往往达不到标准, 由此导致医源性损伤, 发生意外伤害, 不具备相对应的应急处理技能。

3.1.3 环境因素

眼科手术后多需要遮盖患眼, 对患者运动能力造成严重影响, 在环境中有很多危险因素, 使跌倒风险事故发生几率增加。

3.1.4 患者因素

患者缺乏应有的疾病知识和自我防护技能, 对医嘱不够重视。

3.2 防范措施

3.2.1 针对护理人员的职业技能和业务能力提升

做好切实有效的培训和再教育工作, 使其责任意识充分增强, 在理论储备, 实践技能等方面有显著提升, 同时严格贯彻落实相应的护理管理制度, 控制护理风险。

3.2.2 做好护理流程管理

入院时, 要针对患者的具体情况和身心变化进行着重把握, 做好科学合理的护理风险评估。将疑难病症患者纳入到高风险人群, 做好切实有效的护理流程执行和健康教育工作。

4 结论

针对具体的研究过程进行分析, 可以充分看出, 在眼科护理实践中, 要着重针对护理实践中的不安全因素进行全面深入的分析, 以此为基准采取更科学合理的防范措施, 进一步加强护理人员专业技能和业务素养的增强, 针对护理流程进行不断的规范和优化, 做好风险评估和健康教育工作, 多管齐下, 以此充分确保眼科护理质量和护理满意程度得到全面提升, 有效降低护理风险发生几率。

参考文献:

- [1]Cao,H.,Li,L.& Zhang,M.Epidemiology of patients hospitalized for ocular trauma in the Chaoshan region of china,2001-2016[J].PLoS One ,2016,483(77):7-9.
- [2]Quigley H A.Glaucoma[J].Lancet, 2016, 377(9774):1367-1377.
- [3]孙丽.眼科护理安全存在危险因素分析及防范措施[J].贵阳中医学院学报,2017,34(4):153-154.
- [4]肖惠明,潘连.眼科医院护士培训策略与效果分析[J].中国实用护理杂志:上旬版,2016(6):67-69.