

# 体位标识牌在眼科护理风险管理中的应用

贾 茜

四川省绵阳市万江眼科医院, 中国·四川 绵阳 621000

**【摘要】**目的: 进一步深入细致的分析和探究体位标识牌在眼科护理风险管理过程中的应用价值。方法: 随机选取我们医院2019年1月到12月所接收的70例眼科住院患者进行全面细致的分析和探究, 以此作为研究对象, 进一步随机分成对照组和观察组, 每一个组各有35例患者, 其中, 针对对照组实施常规护理方法, 针对观察组是以对照组为基础进一步实施体位标识牌有效应用的护理方法。对患者实施完护理干预之后, 对其护理效果, 护理风险事件发生几率等相关情况展开评价对比。结果: 观察组的护理风险事件发生几率, 护理满意程度等相关指标都要明显优于对照组, ( $P < 0.05$ )。结论: 针对眼科住院患者而言, 在护理实践中结合具体情况有效应用体位标识牌, 这样能够进一步提升患者的护理满意程度, 使其护理风险发生几率充分降低, 呈现出十分显著的临床应用价值。

**【关键词】**体位标识牌; 眼科; 护理; 风险管理; 应用

在本次研究的实践中, 随机选取我院2019年1月到12月所接收的70例眼科住院患者进行全面细致的分析和探究, 进一步深入细致的分析和探究体位标识牌在眼科护理风险管理过程中的应用价值, 希望能够为临床提供一定的参考。现针对具体研究内容做简要分析和探讨。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

随机选取我院2019年1月到12月所接收的70例眼科住院患者作为研究对象, 对其随机分成对照组和观察组, 各35例患者。其中患者中包括男性36例, 女性34例, 年龄最大的是59岁, 最小的是21岁, 平均年龄是45.35岁。两组患者所体现出的基本资料进行比较分析, 不具备显著的统计学差异, ( $P > 0.05$ ), 具有可比性。

### 1.2 方法

针对对照组患者实施常规意义上的风险管理措施, 而对于观察组是在对照组的基础上进一步加之体位标识牌的应用护理措施, 在护理实践中着重做好护理风险的管理。结合实际情况选择相对应的材料, 确保在每一个患者的病床旁都放置相对应的透明底座, 进一步确保底座上面设置4个横向内空插口和2个纵向内空插口, 充分确保特殊护理要求, 体位护理, 管道护理, 饮食护理等相关的不同的标识, 有针对性的插入到相对应的插口之中, 并进一步有效标明不同颜色, 使其具有区分性和差异性。与此同时, 要进一步把白底黄色雕刻字雕刻出十分常见的眼科体位, 使其足够醒目, 起到提示作用, 所涉及的警示内容主要包括仰卧位、半卧位、去枕平卧、侧卧位(左侧或右侧)、俯卧头低位、端坐头低位等一系列相关情况, 充分确保标识的内容有更加清楚的字迹, 色彩鲜艳, 确保护士和患者能够一目了然, 利于患者进行切实有效的辨认。在体位标识牌的应用过程中, 护理人员要结合医嘱做好床头标识的分发工作, 分发结束之后, 要针对相关内容及时有效的核对, 有效规避差错。在值医护人员要着重针对体位标示栏进行详细认真的核对, 并做好提示和督促工作, 同时正确使用术前体位标识牌和术后体位标识牌。患者出院之后, 护理人员要把患者所使用的体位标识牌及时有效地摘下, 并对其进行切实消毒和规范化管理, 确保其整理完毕之后做好有效储存, 以备后续所用。

### 1.3 观察标准

针对两组患者的护理风险事件, 也就是说体位错误的发生率进行相对应的分析和对比。同时, 针对患者的护理满意程度进行有效比较, 采取满意度问卷调查的方式, 所涉及的评分满分为100

分: 90~100分为非常满意, 70~89分为满意, 70分以下为不满意; 患者满意度: 非常满意占比加之基本满意占比。

### 1.4 统计学方法

运用SPSS 24.0统计学软件针对相关数据进行进一步的分析和对比, 用t检验计量资料, 用 $P < 0.05$ 代表对照组和观察组的组间比较差异, 有相应的统计学意义。

## 2 结果

观察组患者的护理风险差错发生率为0.00%, 对照组为17.14% (6/35), 观察组要显著低于对照组( $P < 0.05$ )。在护理满意度方面, 观察组为100%, 要十分显著的高于对照组的85.71% (30/35), 观察组要比对照组有十分显著的提升, 组间比较差异有统计学意义, ( $P < 0.05$ )。

## 3 讨论

针对眼科住院患者而言, 在临床护理实践中要针对患者的体位有更加严格的要求, 相对来讲, 比其他科室要求更为专业, 更为严格, 值班人员在交接班和轮换的过程中, 如果不能及时有效地掌握患者的体位要求, 对于患者的住院安全和康复会造成十分严重的负面影响。对此, 采取醒目清晰的体位标识牌, 可确保护士和患者能够针对其体位情况进行有效的规范, 使其更科学合理, 真正意义上发挥起提醒和警示的作用, 从根本上有效规避临床护理风险, 提升其护理满意程度。

## 4 结论

综上所述, 针对眼科住院患者而言, 在护理实践中结合具体情况有效应用体位标识牌, 进一步提升患者的护理满意程度, 使其护理风险发生几率充分降低, 确保护理过程更安全高质, 该方法有着十分显著的临床应用价值, 值得在眼科护理风险管理过程中进一步大范围推行。

## 参考文献:

- [1]李贡辉, 凡荣欢, 胡影. 眼科门诊患者就诊过程中的护理风险管理[J]. 护理学杂志, 2016, 26(12): 20-22.
- [2]蔡敏. 护理风险管理在眼科门诊的应用效果分析[J]. 医学美容美容旬刊, 2014(12): 360-361.
- [3]王海红. 探讨护理风险管理在眼科门诊的应用效果分析[J]. 内蒙古中医药, 2017, 36(11): 70-71.
- [4]周思萍, 吴裕华. 标识牌在体位管理中的巧用[J]. 母婴世界, 2016(11): 36-38.
- [5]张绍蓉, 罗兴莉, 伍春兰等. 眼科床旁标识牌的设计与应用[J]. 护士进修杂志, 2017, 22(23): 2197-2198.