

神经内科癫痫病的临床诊断及治疗效果

郭 军 马梦曦 朱德坤

石河子大学医学院第三附属医院 / 石河子市人民医院, 中国·新疆 石河子 832000

【摘要】目的: 研究关于神经内科癫痫病在临床诊断及治疗效果方面的内容。方法: 本次实验通过选择我院神经内科在2020年期间收治共70名癫痫病患者的病历资料作为研究对象, 为了避免后期因人数而导致实验结论与实际情况存在差距的情况, 将这70名患者按照随机、平均的原则分为每组均为35人的常规组以及研究组, 治疗方式主要以不同药物来区分, 医护人员会给常规组患者使用德巴金, 而给研究组患者使用德巴金+利必通, 观察最终的治疗效果。结果: 本次实验的观察指标是患者在服用药物之后的不良反应发生率, 结果显示研究组患者的实际情况要明显优于常规组患者, 出现不良反应的患者数量要明显少, 除了不良反应发生率之外, 我们还需要观察两组的治疗有效率, 比较两组之间治疗无效患者的数量, 从而对不同药物的治疗效果进行综合判断。结论: 通过实验结果我们知道在治疗神经内科癫痫病患者时, 将德巴金和利必通这两种药物相结合来用于治疗能够具有更加显著的治疗效果, 同时也能够保证患者不良反应发生率处于正常范围内, 不会对患者的身体健康造成威胁。

【关键词】 神经内科; 癫痫病; 临床诊断; 治疗效果

引言

每个人都有神经系统, 神经系统是我们大脑的重要组成部分之一, 而癫痫病则是一种常见的神经系统疾病, 根据权威调查显示, 人群中癫痫病的患病几率约为0.4%, 也就意味着每1000人里面就有4人患有癫痫病这种脑部疾病, 而在这些患病人群中仍然约有20%~25%的人为难治性癫痫患者^[1]。由于患有癫痫病会对患者的正常生活带来极大的困扰, 因此目前医学界正在致力于攻克这一疾病, 当下使用频率最高、范围最广的治疗手段是药物干预, 手术治疗比例仍然不大, 本文就着重探讨药物干预对神经内科癫痫病所产生的治疗效果。

1 病患资料与诊疗方案

1.1 病患资料

选择我院神经内科在2020年期间收治共70名癫痫病患者的病历资料作为研究对象, 将这70名患者按照随机、平均的原则分为每组均为35人的常规组以及研究组。在常规组中, 男女人数比为17:18, 年龄区间在25~59岁, 患病时间为3~7年; 在研究组中, 男女人数比为3:4, 年龄区间26~54岁, 患病时间为4~9年。

1.2 护理方案

对于癫痫病的治疗工作来说, 医护人员一般会从三个方面采取治疗措施, 分别是控制癫痫发作、病因治疗以及手术治疗, 而采取最多控制患者癫痫病情的方式就是药物治疗, 医护人员需要充分结合患者的致病原因、发病过程以及身体情况来合理选择治疗药物, 在一定范围内调整药物的分量, 争取为患者制定具有针对性的药物治疗方案。目前, 许多医院在治疗癫痫病患者时多主张使用单一药物, 但是随着时间推移, 在完成大量调查之后, 医护人员发现单一药物的治疗有效性有限, 因此一些医院也逐渐开始加入多种药物治疗的方式, 以求更加显著的治疗效果^[2]。

常规组: 主要给该组患者提供德巴金这种药物, 药物使用具体注意说明如下: 由于常规组患者的年龄均高于12周岁, 因此不存在年龄方面的影响; 服用方式为口服, 剂量需要严格按照每天15mg来服用, 但是医护人员可以根据治疗时间的推移以及患者身体情况在5mg范围之间进行调整; 如果遇见病情较为严重的患者则需要加大用药剂量, 但是需要保证每日服药量不可超过30mg。

研究组: 在使用德巴金的基础上加入利必通, 药物使用具体注意说明如下: 德巴金的使用情况和常规组一致, 医护人员在给患者使用利必通药物之初, 需要保证药物剂量为每天25mg, 之后以7天为一个周期, 周期内不需要给患者提供利必通, 每个周期

后需要在原基础药物剂量的基础上增加25mg, 加入药物的剂量也需要参照患者病情的实际情况^[3]。

1.3 观察指标

分别为药物治疗有效率以及患者在服药后的不良反应发生率。

2 结果

2.1 药物治疗有效率

由数据可知, 常规组的治疗有效率为68.58%, 而研究组的治疗有效率却高达94.29%, 两组数据之间存在较大的差异。

2.2 患者在服药后的不良反应发生率

由调查数据后可知常规组的不良反应发生率为42.86%, 而研究组的不良反应发生率仅为11.43%。

3 讨论

癫痫病是一种较为常见的脑部疾病, 这种疾病的存在让许多家庭都苦不堪言, 同时给患者的正常生活带来极大的影响, 患者无论是在身体上还是精神上都会受到巨大的伤害, 且由于癫痫患者在疾病发作时意识会模糊, 因此对其生命安全造成极大的潜在威胁, 根据研究显示, 造成癫痫病的病因有先天发育不良(例如染色体异常)、结节性硬化症、老年性痴呆症等^[4]。本文中在治疗癫痫病患者时主要使用了两种药物, 分别是德巴金(又称丙戊酸钠缓释片)和利必通(又称拉莫三嗪), 这两种药物都对缓解癫痫病病情有着明显的作用。本文中通过对两组患者治疗效果的比较, 得到了联合用药(德巴金+利必通)能够产生更加显著的治疗效果这样的结论, 因此医护人员在进行治疗工作的过程中需要严格按照用药标准来为患者提供药物, 同时给患者叮嘱必要的事项, 定期给患者进行心理疏导, 帮助其树立战胜病魔的信心。联合用药的优势在于能够在降低患者不良反应发生率的前提下, 还能够进一步提高治疗的有效率, 为癫痫病患者病情的恢复提供了巨大的助益, 为众多医院提供了可供选择的治疗方案。

参考文献:

- [1] 齐爱华. 探讨神经内科癫痫病的临床诊断及治疗效果[J]. 人人健康, 2020.
- [2] 王新征. 神经内科癫痫病临床诊断及治疗效果探讨[J]. 临床医药文献电子杂志, 2020, v.7; No.474(53):142+146.
- [3] 赵理英. 神经内科癫痫病临床诊断及治疗效果探讨[J]. 家庭保健, 2020, 000(002):242.
- [4] 张冰雪, 高婷婷, 王晓林, 等. 神经内科癫痫病临床诊断及治疗效果分析[J]. 养生保健指南, 2019, 000(032):62.

通讯作者: 朱德坤