

急救护理流程在严重多发伤患者急救中的应用及满意度分析

赛比·阿不都艾尼 乃依曼·阿布都苏力 沙力比艳·提力瓦力迪 茹山古丽·图尔荪 乃比赛·阿不都尼
新疆维吾尔自治区维吾尔医医院, 中国·新疆 乌鲁木齐 830001

【摘要】目的: 分析急救护理流程在严重多发伤患者急救中的应用及满意度。方法: 观察对象筛选我院急诊收治的严重多发伤急救患者, 共计90例, 观察对象筛选时间节点2019年01月-2019年12月, 按照入院奇偶数分组模式, 45例患者收录于对照组, 实施常规护理, 45例患者收录于观察组, 实施急救护理流程。比较不同护理法对两组患者的临床指标、护理满意度及护理质量。结果: 比较对照组, 观察组临床指标明显改善, 护理满意度高, 护理质量评分高, $P < 0.05$ 。结论: 在严重多发伤患者急救中运用急救护理流程, 临床指标明显改善, 有效提高了患者的护理满意度及护理质量。

【关键词】急救护理流程; 严重多发伤; 急救; 临床指标; 护理满意度

随着现代化生活方式的改变, 车辆代步已经成为社会的常态, 但同时增加的还有交通意外事故, 尤其是多发伤事故, 致使居民的生命健康被威胁。多发伤作为临床中常见的一类病症, 因患者机体外部多处损伤、内部脏器损伤严重等因素的影响, 导致患者的生命安全被威胁^[1]。因此, 为了提高多发伤患者的急救效果, 给予此类患者急救护理流程, 详细数据结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

观察对象时间节点范围2019年01月-2019年12月, 筛选观察对象: 我院严重多发伤患者, 共计90例, 按照入院奇偶数分组模式, 每组收容45例。

对照组(常规护理模式): 样本年龄节点范围20岁-64岁, 年龄临界范围经分析(42.08 ± 3.29)岁, 男女比26:19, 类型: 摔倒10例、重物击打5例、交通意外23例、高处坠落3例、锐器伤4例, 受伤部位: 2处16例、3处6例、4处15例、5处以上8例; 观察组(急救护理流程): 样本年龄节点范围21岁-64岁, 年龄临界范围经分析(42.10 ± 3.32)岁, 男女比25:20, 类型: 摔倒11例、重物击打6例、交通意外21例、高处坠落4例、锐器伤3例, 受伤部位: 2处18例、3处7例、4处13例、5处以上7例。资料中相关参数专业人员收录, 输入统计学系统筛选、分类, 两组数据结果比较, 差异不明显, 无统计学价值 $P > 0.05$, 可实施对比分析。

纳入标准: 经过多发性伤诊断, 确诊; 无凝血功能障碍及手术禁忌者。

排除标准: 恶性肿瘤或者血液传染疾病者; 凝血功能异常者; 不愿配合临床服务者。

1.2 方法

1.2.1 对照组

常规护理干预, 措施: 绿色通道开通, 维持患者呼吸道顺畅, 保护呼吸道, 同时静脉通路建立, 护士与医生积极、有效地配合, 提高救治成功率。

1.3 分析指标

急救护理流程, 措施: (1)急救小组创建: 由护士长组建, 邀请高年资的护士共同组建急救小组, 确定组内成员工作和任务, 工作指挥权统一交由小组长。另外为了保证组员操作的熟练度, 及时补充新药物等知识, 每周及月度组织学习, 提高组员急救操作技能水平。(2)患者到达医院后, 第一时间绿色通道打开, 对患者的病情运用ABBCS评分进行测估, 急救小组成员有序开展服务, 做好气道维护, 保持患者通畅的呼吸, 同时对患者的生命体征数据进行监测, 及时发现异常波动; 静脉通路快速且精准建立, 心电图检查^[2]。(3)组员做好患者口腔清洁, 呼吸道通畅度维持, 按照面部情况, 提供吸氧面罩或者鼻罩, 必要时辅助患者实施心脏复苏; 对患者的病情变化严密监控, 发现异常波动, 上报医生快速采取有效急救措施。

1.3 观察指标

1.3.1 临床指标

对两组患者的临床指标进行观察, 内容包括: 抢救时间、采血至用血时间、救护车到达时间、手术开始时间、住院平均时间。

1.3.2 护理满意度及护理质量

利用医院调查表对护理满意度和护理质量进行评估, 每项分值100分, 分值高即为满意度高, 护理质量优。

1.4 统计学方法

我院研究经过专业人员收录, 利用统计学系统对研究中相关参数进行检验, 经筛选、分类, 区分为两种数据, 两种数据全部采用SPSS24.0版本检验核对, 计数数据非参数多次检测, 表述用%, 持续性计量数据资料方差多次检测, 表述用均数 \pm 标准($\bar{x} \pm s$), 组间t、 χ^2 与P比较分析, 结果差值 $P < 0.05$, 表示研究具备高统计学价值。

2 结果

2.1 临床指标

两组患者的临床指标经过比较, 比较对照组, 观察组患者的抢救、采血至用血、救护车到达、手术开始及住院平均时间更短, $P < 0.05$ 。

2.2 护理满意度及护理质量

对照组护理满意度(65.87 ± 6.89)分, 观察组护理满意度(82.67 ± 3.46)分, $t = 14.6171$, $P = 0.0000$; 对照组护理质量(70.21 ± 8.76)分, 观察组护理质量(88.79 ± 4.57)分, $t = 12.6147$, $P = 0.0000$ 。

3 讨论

因现代化生活方式、生活质量的改变, 日常生活中严重多发伤事故越来越多, 致使居民生活质量降低。严重多发伤患者比较其他病症而言, 该疾病属于急性病症, 唯有最佳时间段内得到救治, 临床疗效方可提高。实施有效的护理方案对救治成功率提高具有促进作用, 故而本研究以收治的患者为对象, 给予急救护理流程, 结果显示: 比较对照组, 观察组患者的临床各项指标明显改善, 护理满意度高, 护理质量高, $P < 0.05$ 。研究分析, 急救护理期间, 多发伤患者需要关注最佳抢救时间短, 经过科学、高效的分工合作, 护士认真负责, 及时做好检查, 缩短检查所需时间, 保证临床救治最佳时间, 最大限度提高患者的救治成功率。此外, 比较常规护理, 急救护理流程重视护士之间的相互配合, 经过病情联系, 电话引导, 急救处理, 保证患者顺畅地呼吸道, 进而减少不良事件。

综上所述, 对严重多发伤急救中运用急救护理流程, 护理效果显著, 提高患者护理满意度。

参考文献:

- [1]王惠珍, 郑福珍. 优化严重多发伤急救护理流程在急诊患者中的应用研究[J]. 中国医药指南, 2021, 19(25): 167-169.
- [2]郭朝阳. 急救护理流程应用于严重多发伤患者急救中的价值评价[J]. 黑龙江中医药, 2021, 50(2): 209-210.