


她誓怎城娘囉(天)fm| 搵勢耐誓康T 勢耐伉慮(天)0 類暨▼
ク忤ン妮她悉夙夙夙際T 吹 1 | 咋匕伶 | 搵扁 b 懲儼
嫩(天)掂伉匡揚同箇L 天暨▼ ク忤伉剛刺啗nm勑俯際 | 伉夙
徒她擔九忤nA L nm誓【豐咕妻她她椒咪甸哇劇啖啖儼(天)
fm(天) L 耐↑傲傲♪(天) L 耐惹ヨ(天)家响斗怙恠誓勢耐 | nA
▼ 懈低 | ♪ 棠(天)慮 | 搵?x 她吧復耐↑ 壘忤nA壯側借城
娘 壘俱Gy 暨(天)展賣nF./05.2際庇 | 誓劬咕(天) L 耐認
庇 | 耐 || 搵她剋k(天)耐 || 伉 @_sl 丁 Aj_p c暨0..4際她工
儼 | 誓傲局怙 | 丁境她同箇惹ヨ | L 搵乙啞↑ 堡L 啖誓儼
囉(天) | | 慮誓伉啖慮誓 | 誓儼依她家怕儼屺(天) 婁
榭nm儼ナ乙宦T 劬T 搵↑

儼二响尋她 | | 啖在啖全噴她吐搵寬慰 | 丁境她
ざ刻↑ 【豐 Q_pNjsqJ g'p.pvA_r_jnascyT Mtgb KCBJ G C
同箇天惹ヨ 全噴她壳佞啖誓啖咕怕懼搵 壘 | 慮(天)
. 類?彙她城娘 | T 耐 庇揮辱孽她T剋刺誓【豐 唾壯
吐啖丁T 搵惱暨KcQF 丁 CKRPCC際 | 啖城娘她妻她互
權T 仍 | T 徒テ拳惱暉 | 搵她怙Y 怙 | 搵怙L Y 怙 |
搵吃岡Y 丁T | 搵ン供Y ↑ L 儼T テ拳偉納丁她娑埤冒哈
搵 L 儼僂傳嫌娶T MPY 丁T ? LBY 納家μ誓▼ う伉辱孽
 | 【豐↑k(天) L 惱丁儼成娶影豐啖勁側辱孽堯佳兢庇揮ナT
剋刺↑ T 耐 標忤啖孽嬲處誓印 | 啖慄慮恁搵她 | | 啖否惹
ヨ | 儼空孽↑

| 搵暉峯瀆帶咕風丁份捻 | 搵咕風她怙吐同扉瓠儼↑
瓠L 儼啖孽L 她城娘她哈搵丁叁惹惹ヨ 嬌儼誓 妮儼娶μ
咽• 她城娘宙夕↑ 榭nm 罷澤儼T 城娘她夕吐吐嬌誓 (天)伉
L 嚙低 ♠ | 儼▼ 妮儼啖Pa关宙夕城娘她剋L | ↑ 伉噴搵
她• 宙夕丁卵掃 | 儼認影忝冷兢豐 | 傑劬孽寔偵呼丁
戀帛乙啞暨NP GQK ? 際嚙娶互她控儼勻kQ 搵妻暨K nf cp=
J g'cp_rg=Rcrxj_d丁 ? jrk_l 暨0..7際↑ 屑怙搵證怕她吐嬌↑
(天)展吐搵娘榭• 暨Cl bL nnc V5際豐 | 宦空啖孽她吐嬌兢
卵掃扇俯丁埤棟↑

T 耐 え 惹丁 儼惹儼荆同箇L 儼扉佛呼搵搵她愧占誓响
尋 | | 啖哥暨E pcaf 丁 E pcaf 暨0.0/ 際↑ 儼妮(天) 伉儼
扉搵儼微 | 耐 劬咕扇從她儼荆T 搵誓康 | | 夙徒她慮娶誓
伶T | 儼微 | 搵儼 | 挽她夕搵同箇 | 占儼兌啖箇μ儼啖
她T 徒尔搵↑ 噴俠誓儼嫁啖哥她兀(天)丁 【豐 | 吸伉庇揮儼
吳↑ 【豐她啖哥啖她儼 | 劬妮↑



佻 / 啖哥啖她

1,0 ◀ 佻

怎啖哥啖啖箇 @_sl 丁 Aj_p c 暨0..4際Rf nk_q 丁
F_pbc 暨0..6際 ← BcT cjjg暨0./0際 ← Apcqj暨0./3際
丁 R_w丁 H`暨0./5際乙L 庇 | 她工儼响尋她↑ Apcqj
暨0./3際 她儼二响尋(天) | 儼惹 | 儼依荆家啖愧斗T
儼扉儼二她慮娶↑ 儼儼啖搵誓 庇L 儼荆家啖誓儼T 家
啖儲宗影T 搵乙啞T 家吐 ← 婁丁T 搵↑ 儼儼 | 搵儼誓
尋帆儼勻• 愧占T 心 | 佻她搵妻誓儼 | 婁儼占T 儼扉誓儼
T 搵儼占T 搵儼↑ 儼治不城娘 | 她◀ 佻响尋慮娶 | 儼瀆
怎(天) | 榭扁誓 | 儼 | 儼儼二她响尋 | 【豐怙儼家啖誓慶
 | 儼慶o 匿境咕吐搵 | 咕テ怎T 搵她响T 啖搵 | 【豐(天)nm
她(天)儼 | | 啖在啖啖T 耐 响尋 | | 吳 | 吞勢耐棠(天)
 | 吞怎T 搵她境咕忤箇佻她儼二↑

佻 Rf nk_q 丁 F_pbc 暨0..6際她 | 孀吐嬌 | 誓x 儼庇
T | | T 搵乙啞慮娶誓怎慮娶关暨 | 側扉吐搵誓扁 | 啖
区迥循堯关暨 | (天)儼依荆同箇↑ 噴响豐娶节她佻(天)搵
儼催怙儼依荆城娘她家啖后μ 孽寔低◦ | 呀卹孽丁 丕
惹 【豐哈家响斗丁哈 | 啖她慮娶↑x 儼儼 | 宦テ | 儼
惹城娘她儼荆城娘 | 儼儼 | 儼儼啖 | 【豐誓 | 儼 | T
T T 搵寬μY ↑ 儼瀆 | @_sl 丁 Aj_p c 暨0..4際庇 | 她テ
 | T 搵乙啞慮娶她(天) | 榭扁誓 | 儼兢啖咕儼匪家豐惹ヨ
賣她誓扁啖佻呼 | 儼搵儼依荆城娘她家啖誓兢互儼 | ◦ • 儼
惹T T シ快 | 婁Y 扁 | 啖家豐她提搵↑ 唾壯 | 婁儼nm影况
變T T 儼惹荆T 搵Y 誓儼T T 儼惹荆T 搵Y 影惹 | 儼儼斗
T T 乙啞荆T 搵Y ↑ 儼儼儼惹荆T 搵啖忙 | 啖儼T 徒城娘
家啖她

劬家誓 | 乙啞荆T 搵哈惹 | 儼誓 | 儼儼惹荆T 搵惹
ヨ乙宦俠誓慶庇 | 耐 儼彥グ學↑ 儼儼啖儼良考 | 搵心她家
响 ← 儼彥丁 ぼ忿暨Rf nk_q 丁 F_pbc 暨0..6際 | 儼治不她
城娘 | 誓Rf nk_q_l b F_pbc 暨0..6際儼惹她T 搵寬μ慮娶
影关暨 | 吐搵寬慰 | ooads她城娘她后μ↑儼 | 慮娶ク忤儼
吐搵寬慰后μL 心儼二 | ↑

卻 | 啖儼怙同箇丁吐搵她兜ヨ乙啞家啖豐 | T 儼
二她响尋庇 | ざ刻暨佻 / 際 | 儼啖誓家nF暨 | 尤際丁シ
快 | 婁暨 1 尤際劬T 儼 | 她搵妻暨暨 0 尤際 | k(天)啖

11(1), 68-72.

[17] Parahoo, K. (2014). Nursing research: principles, process, and issues (Third ed.). London, UK: Palgrave Macmillan.

[18] Polit, D. F., & Beck, C. T. (2010). Generalization in quantitative and qualitative research: Myths and strategies. International Journal of Nursing Studies, 47(11), 1451-1458.

[19] Sudlow, C. L. M., & Warlow, C. P. (1996). Comparing stroke incidence worldwide. What makes studies comparable? Stroke, 27, 550-558.

[20] Sullivan, K., & Dunton, N. (2004). Development and validation of the stroke knowledge test. Topics in Stroke Rehabilitation, 11(3), 19-28.

[21] Tay, L., & Jebb, A. T. (2017). The SAGE encyclopedia of industrial and organizational psychology (2nd ed.). Newcastle upon Tyne, UK: SAGE.

[22] Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. BMC Medical Research Methodology, 8(1), 45-55.

[23] Trochim, W. M. K. (2001). Research Methods Knowledge Base: Atomic Dog Pub

搖冷暉 | 搵姬忱恹 ♠ 傷二暨SKAT際

噉喇暉康呀 | | 伉客傷二暨度埗匹倭三匱 | 𠵼𠵼 | 伉客呼妍呀嘎冒nA崑σ处咕 | kel

嫠 1 懷乙暉 | 𠵼 寔忡

恹仔丁勃佼𠵼𠵼, μe 際她媿喚

D1	非說	是
D2	唔到	是
D3	西醫	馬醫地話 基卑
D4	持獎	戈德
D5	馬醫地話	北 中

		是
D6	教育	基本的 作學 業三
D7	收入	< 之間 >
D8	風險因素	上一市 心血管病轉錄 帶由庄 穩穩定
D9	医护人员	是 否

嫠 2 懷乙暉 | 搵喇忱

恹 | 𠵼 | 𠵼 | 倭 | 倭 | | nA崑她媿俯佬傲傲 | 捷捷
め丁𠵼关暉

1	2	3	4	5
非常同意	同意	未定	不同意	强烈反对

		回答
K1	吸烟是中风的风险因素	
K2	中风比乳腺癌更常见	
K3	脑卒中是常见的疾病	
K4	压力过大可能会导致中风	
K5	先前的短暂性脑缺血发作(TIA)会增加未来中风的风险	
K6	中风影响心脏	
K7	中风会导致长期残疾和死亡	
K8	中风是缺血性脑卒中的原因	
K9	中风在女性中更常见	
K10	糖尿病会增加中风的风险	
K11	头痛是中风的前兆	
K12	突然丧失感觉与中风无关	
K13	中风总是以症状为特征	
K14	中风不能通过锻炼来预防	
K15	"Act FAST"活动中的首字母缩写词"FAST"代表Face,Arms,言语和时间	
K16	应建议中风患者采取久坐不动的生活方式	
K17	大众媒体广告和卒中教育传单可有效提高对卒中的认识和教育	

		回答
R1	如果他的症状没有改善,一个人应该只打电话给他的全科医生	
R2	一个人应该立即去综合医院或附近的医院	
R3	一个人应该快步行走,避免不必要的延误	
R4	在采取任何行动之前,应与他人/患者商量	
R5	紧急电话是112	
R6	如果给予适当的治疗,中风症状和长期预后可能会有所改善	
R7	中风患者应该总是就医	
R8	在采取任何行动之前应该说"双星"	
R9	患者应抬高下肢	

R10	针灸是治疗中风的有效方法	
R11	无论一个人的反应如何,中风都会进展	
R12	应该立即叫救护车	
R13	看电影的人可能没有意识到他正在中风	
R14	如果患者能够开车去急诊室,他应该立即这样做	
R15	6小时后不能进行"静脉溶栓"治疗(t-PA)	
R16	脑细胞在中风时受到不可逆的损伤,损伤程度与时间有关	
R17	中风患者经常自己寻求帮助,以免成为他人的负担	