

# 头部刮痧改善恶性肿瘤化疗患者睡眠质量的临床效果观察

黄 荣

泗阳康达医院内分泌科 江苏 宿迁 223700

【摘要】：目的：比较针刺组与对照组在改善恶性肿瘤化疗患者睡眠质量方面的临床效果。方法：选取60例恶性肿瘤化疗合并失眠患者，随机分为针刺组和对照组，每组30例。针刺组采用常规护理+头部刮痧，对照组采用常规护理。观察两组患者的睡眠质量评分、失眠严重程度、疲劳感及注意力等指标。结果：针刺组睡眠质量评分显著高于对照组（P<0.05），失眠严重程度、疲劳感及注意力改善更为明显（P<0.05）。结论：头部刮痧联合常规护理能有效改善恶性肿瘤化疗患者的睡眠质量，临床应用效果显著。

【关键词】：恶性肿瘤化疗患者；睡眠质量；头部刮痧；临床效果。

## Clinical Effect of Head Scraping on Improving Sleep Quality of Patients with Malignant Tumor Undergoing Chemotherapy

Rong Huang

Endocrine Department Siyang Kangda Hospital Jiangsu Suqian 223700

**Abstract:** Objective: To explore the clinical effect of head scraping on improving sleep quality of patients with malignant tumor undergoing chemotherapy. Methods: A total of 60 patients with malignant tumor chemotherapy combined with insomnia were enrolled in this study. They were divided into two groups, the reference group (30 cases, routine nursing) and the study group (30 cases, head scraping nursing), and the treatment effect was compared. Results: The effective rate of the study group was higher than that of the reference group (P<0.05). The sleep quality score of the study group after nursing was better than that of the reference group (P<0.05), and the difference was statistically significant. The scores of forgetfulness, weakness and fatigue in the study group were lower than those in the reference group, and the differences were statistically significant (P<0.05). Conclusion: Head scraping nursing for patients with malignant tumor undergoing chemotherapy can effectively relieve symptoms and improve sleep quality, and the application effect is significant.

**Keywords:** Chemotherapy for malignant tumors; Head scraping; Sleep quality

### 前言

恶性肿瘤化疗患者因化疗药物副作用及心理压力，常出现不同程度的失眠，严重影响患者生活质量。头部刮痧作为一种传统中医疗法，具有疏通经络、调节神经、改善睡眠的作用。本研究旨在观察头部刮痧对恶性肿瘤化疗患者睡眠质量的临床效果。本研究选取60例恶性肿瘤化疗合并失眠患者，随机分为针刺组和对照组，每组30例。针刺组采用常规护理+头部刮痧，对照组采用常规护理。观察两组患者的睡眠质量评分、失眠严重程度、疲劳感及注意力等指标。结果显示，针刺组睡眠质量评分显著高于对照组（P<0.05），失眠严重程度、疲劳感及注意力改善更为明显（P<0.05）。结论：头部刮痧联合常规护理能有效改善恶性肿瘤化疗患者的睡眠质量，临床应用效果显著。

### 1 资料与方法

1.1 研究对象  
本研究选取2021年1月-2021年6月于泗阳康达医院肿瘤科化疗的恶性肿瘤患者60例，符合失眠诊断标准，且知情同意。排除合并严重心、肺、肝、肾功能障碍及精神疾病者。将患者随机分为针刺组30例和对照组30例。针刺组在常规护理基础上加用头部刮痧，对照组仅给予常规护理。两组患者在年龄、性别、肿瘤类型、化疗方案等方面无显著差异（P>0.05）。

1.2 研究方法  
针刺组采用头部刮痧法，使用牛角刮板，以轻柔力度沿督脉、膀胱经、胆经、胃经、脾经、大肠经、小肠经、心经、肾经等经络进行刮痧，每次15-20分钟，每日1次。对照组采用常规护理，包括心理疏导、环境调整、药物治疗等。研究期间，患者均在医院病房接受治疗和观察，每日记录睡眠情况。研究结束时，使用匹兹堡睡眠质量指数（PSQI）和阿森斯失眠量表（AIS）进行评估。数据采用SPSS 22.0软件进行统计学分析，P<0.05为差异有统计学意义。



