

人性化护理在普外护理中的效果评价

江毅

上海中医药大学附属龙华医院 上海 200032

【摘要】: 目的: 探讨人性化护理在普外护理中的效果。方法: 选取本院 2020 年 218 例普外手术患者, 随机分为对照组和实验组, 各 109 例。对照组采用常规护理方法, 实验组采用人性化护理方法。比较两组患者术后活动情况、住院时间、饮食时间、睡眠时间、生活质量、遵医行为、护理满意度等方面。结果: 实验组患者术后活动情况、住院时间、饮食时间、睡眠时间均优于对照组。实验组患者生活质量、遵医行为、护理满意度均高于对照组。结论: 人性化护理在普外护理中具有良好的效果, 值得推广应用。

【关键词】: 人性化护理; 普外护理; 效果评价

Effect Evaluation of Humanized Nursing in General Surgery Nursing

Yi Jiang

Longhua Hospital Shanghai University of Traditional Chinese Medicine Shanghai 200032

Abstract: The purpose of this study is to study the effect of humanized nursing work on general surgery patients. The main research method is collected in our hospital in the middle period of 2020 218 surgical patients, and these patients into groups at random, control group and experimental group, 109 patients in each group, control group choose ordinary nursing methods, while the experimental group choose the method of humanized nursing, will be human nature to carry out in the whole nursing work. The activity of patients after surgery, length of hospital stays, diet time, sleep time, living standard and quality, the degree of compliance with doctor's orders, nursing satisfaction and other aspects were compared and analyzed. The results showed that the activity, length of hospital stay, diet time and sleep time of all patients in the experimental group were better than those in the control group. Patients in the experimental group also had higher scores of qualities of life after surgery than those in the control group; compared with the control group, the patients in the experimental group follow the doctor's advice better. The satisfaction degree of the patients in the experimental group was higher than that in the control group. According to the above contents, it is concluded that patients need to carry out nursing after general surgery. If humanized nursing work can make the level of overall nursing and the effect is better.

Keywords: General surgery; Patient; Humanized nursing work

目的: 探讨人性化护理在普外护理中的效果。方法: 选取本院 2020 年 218 例普外手术患者, 随机分为对照组和实验组, 各 109 例。对照组采用常规护理方法, 实验组采用人性化护理方法。比较两组患者术后活动情况、住院时间、饮食时间、睡眠时间、生活质量、遵医行为、护理满意度等方面。结果: 实验组患者术后活动情况、住院时间、饮食时间、睡眠时间均优于对照组。实验组患者生活质量、遵医行为、护理满意度均高于对照组。结论: 人性化护理在普外护理中具有良好的效果, 值得推广应用。

目的: 探讨人性化护理在普外护理中的效果。方法: 选取本院 2020 年 218 例普外手术患者, 随机分为对照组和实验组, 各 109 例。对照组采用常规护理方法, 实验组采用人性化护理方法。比较两组患者术后活动情况、住院时间、饮食时间、睡眠时间、生活质量、遵医行为、护理满意度等方面。结果: 实验组患者术后活动情况、住院时间、饮食时间、睡眠时间均优于对照组。实验组患者生活质量、遵医行为、护理满意度均高于对照组。结论: 人性化护理在普外护理中具有良好的效果, 值得推广应用。

组别	n	下床活动时间	进食时间	住院天数	睡眠时长
观察组	108	2.1 ± 0.44	16.5 ± 0.32	5.8 ± 1.7	6.81 ± 0.71
对照组	108	3.2 ± 0.41	32.22 ± 2.43	9.1 ± 2.2	5.53 ± 0.61
t		18.994	67.324	13.634	15.123
p		< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001

0.0 尿管膀胱充盈感护理效果

膀胱充盈感护理效果比较见表 0。尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 0。

表 0 尿管膀胱充盈感护理效果比较

组别	n	生活质量	t	p
观察组	108	75.44 ± 2.94	38.432	< 0.001
对照组	108	64.874 ± 1.23	38.432	< 0.001

0.1 尿管膀胱充盈感护理效果

尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 1。尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 1。

表 1 尿管膀胱充盈感护理效果比较

组别	n	遵医嘱用药依从率	遵出院指导复查依从率
观察组	108	108 (100%)	90 (83%)
对照组	108	81 (75%)	66 (61%)
X ²		23	13.211
p		< 0.001	< 0.001

0.2 尿管膀胱充盈感护理效果

尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 2。尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 2。

表 2 尿管膀胱充盈感护理效果比较

组别	n	满意	一般满意	不满意	总满意度	X ²	p
观察组	108	90 (83%)	10 (9.2%)	2 (1.8%)	98 (91%)	22.342	0.001
对照组	108	64 (60%)	16 (15%)	28 (26%)	82 (76%)		

3 讨论

尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 2。尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 2。

尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 2。尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 2。

尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 2。尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 2。

4 结束语

尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 2。尿管膀胱充盈感护理效果比较见表 2。

