

硝呋太尔胶囊治疗慢性宫颈炎的临床观察

韩江爱

(舟曲县妇幼保健计划生育服务中心 甘肃 甘南 746300)

【摘要】目的：分析硝呋太尔胶囊治疗慢性宫颈炎的临床疗效。方法选择2017年9月-2019年8月我院收治的44例慢性宫颈炎患者为对象，按照不同的用药方式分组，分别是甲组和乙组，分别实施的是常规治疗和硝呋太尔胶囊治疗，治疗后对结果分析。结果：对比分析病例的整体治疗结果，乙组的总有效率高于甲组，90.9% > 72.7%。对比分析两组病例的不良症状消失时间，乙组的白带减少时间、外阴瘙痒消失时间、外阴阴道疼痛消失时间等少于甲组。结论：针对慢性宫颈炎的患者实施硝呋太尔胶囊治疗，整体上有一定的积极作用，缓解患者的不良反应，值得实施和推广。

【关键词】硝呋太尔胶囊；慢性宫颈炎；效果分析

【中图分类号】R711.32 **【文献标识码】**B

慢性宫颈炎的临床发生几率比较高，对患者自身有一定的不良影响，针对具体情况，需要注意的是明确临床的具体情况，及时对患者进行治疗，促进患者的恢复。当前在临床研究中治疗慢性宫颈炎的药物比较多，以硝呋太尔胶囊为主，治疗效果明显，能缓解患者的不良反应。为了分析硝呋太尔胶囊治疗效果，选择44例慢性宫颈炎患者为对象，按照不同的用药方式分组，分别是甲组和乙组，分别实施的是常规治疗和硝呋太尔胶囊治疗，治疗后对结果分析。详细的数据分析如下：

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择44例慢性宫颈炎患者为对象，按照不同的用药方式分组，分别是甲组和乙组，分别实施的是常规治疗和硝呋太尔胶囊治疗，治疗后对结果分析。其中甲组的年龄区间在22-45岁，平均年龄(33.25±0.28)岁，病程在1个月-21个月，平均病程(11.25±0.25)个月。乙组的年龄区间在22-46岁，平均年龄(34.25±0.28)岁，病程在1个月-24个月，平均病程(12.36±0.28)个月，对比两组病例的基本资料，差异不明显，不具备统计学意义(p > 0.5)，具备可比性。

1.2 方法

甲组的病例实施的是常规方式进行治疗，将外阴进行清洗，将2粒复方磺胺甲

恶唑片药粉0.4g，含甲氧苄啶80mg置于宫颈表面，每日1次。乙组在甲组的基础上应用

硝呋太尔胶囊，采用的是口服方式，每次0.2g，每日3次，连续应用10天之后观察结果，对两组病例的基本用药情况分析^[1]。

1.3 指标分析

1.3.1 分析两组病例的治疗结果；

显效：患者的各项指标恢复正常，阴道分泌物和细菌培养后为阴性。有效：患者的各项体征呈现出好转趋势，检查阴道分泌物是阳性。无效：无恢复趋势，检查后各项指标均是阳性。总有效率指的是显效率+有效率。

1.3.2 对比分析两组病例的临床不良症状消失时间；

对比分析白带减少时间、外阴瘙痒消失时间、外阴阴道疼痛消失时间；、

1.4 统计学方法

采用SPSS19.0软件进行数据处理，计量资料以x±s表示，采用t检验，计数资料用百分比表示，采用χ²检验，P < 0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 分析两组病例的治疗结果

对比分析病例的整体治疗结果，乙组的总有效率高于甲组，90.9% > 72.7%，数据分析，乙组的优势明显，详细如表一：

表一：两组病例的总有效率对比

组别	例数 (n)	显效 (n)	有效 (n)	无效 (n)	总有效率 (%)
甲组	22	14	2	6	72.7
乙组	22	17	3	2	90.9
P 值	—	—	—	—	0.00
χ ²	—	—	—	—	6.98

2.2 对比分析两组病例的临床不良症状消失时间

在本次研究中对分析两组病例的不良症状消失时间，乙组的白带减少时间、外阴瘙痒消失时间、外阴阴道疼痛消失时间等少于甲组，数据对比具备统计学意义(p < 0.05)，数据分析如表二：

表二：两组病例的不良症状消失时间对比

组别	例数 (n)	白带减少时间 (d)	外阴瘙痒消失时间 (d)	外阴阴道疼痛消失时间 (d)
甲组	22	8.25±0.14	7.58±0.25	6.28±0.14
乙组	22	5.25±0.15	4.23±0.14	3.26±0.17
P 值	—	0.00	0.00	0.00
t 值	—	7.69	6.98	8.69

3 讨论

慢性宫颈炎是当前临床研究中常见的一种妇科疾病，患者会出现生殖系统疾病，针对病灶的特殊性，需要及时采取有效的药物进行治疗。其中复方磺胺甲恶唑片有一定的作用，抗菌作用明显，在治疗中可抑制多种革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌^[2]。硝呋太尔属于呋喃衍生物，治疗效果明显，在治疗中可杀灭衣原体和支原体等，在治疗中需要对患者进行适当的指导和教育，使其明确临床给药的注意事项，只有积极配合接受后续治疗，才能促进患者的恢复，在整体治疗中，依据临床具体治疗要求可知，有序接受治疗之后促进了患者的恢复^[3]。

对比分析病例的整体治疗结果，乙组的总有效率高于甲组，90.9% > 72.7%，数据分析，乙组的优势明显。对比分析两组病例的不良症状消失时间，乙组的白带减少时间、外阴瘙痒消失时间、外阴阴道疼痛消失时间等少于甲组。说明针对慢性宫颈炎的患者实施硝呋太尔胶囊治疗，整体上有一定的优势，促进了患者的恢复。

综上所述，硝呋太尔胶囊在治疗慢性宫颈炎中有一定的积极作用，促进了患者的恢复，值得借鉴和实施。

参考文献：

[1] 黄建霞, 林伟敏, 钟丽红. 硝呋太尔胶囊治疗慢性宫颈炎的疗效 [J]. 深圳中西医结合杂志, 2019, 29(18): 84-85

[2] 辛欢. 克拉霉素联合硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊治疗非淋菌性宫颈炎的临床疗效及安全性 [J]. 临床合理用药杂志, 2018, 11(33): 83-85

[3] 耿硕, 李华军. 硝呋太尔制霉菌素阴道软胶囊治疗黏液脓性宫颈炎疗效的观察 [J]. 中国妇幼保健, 2013, 28(32): 5414-5415