

研究宫颈炎患者应用左氧氟沙星联合阿奇霉素治疗的效果

尚维华

(舟曲县妇幼保健计划生育服务中心 甘肃 甘南 746300)

【摘要】目的：分析宫颈炎患者应用左氧氟沙星联合阿奇霉素治疗的效果。方法：将2018年1月至2019年12月于本院就诊的86例宫颈炎患者视为研究对象，任意编号后纳入研究组与参照组(n=43)。参照组使用阿奇霉素治疗，研究组联合使用阿奇霉素与左氧氟沙星治疗，对比患者的治疗效果及恢复时间。结果：研究组病患的症状恢复率是97.67%，参照组病患的症状恢复率是83.72%，研究组的恢复率更高(p<0.05)。研究组病患的症状缓解时间、宫颈修复时间均相对较短，与参照组时间指标对比有统计学意义(p<0.05)。结论：左氧氟沙星联合阿奇霉素治疗宫颈炎的效果较好，可快速改善患者的临床症状，提高患者的临床治疗有效率。

【关键词】宫颈炎患者；左氧氟沙星；阿奇霉素

【中图分类号】R711.32 **【文献标识码】**B

宫颈炎是妇科常见的疾病类型，多见于育龄期女性患者^[1]。宫颈炎发病机制在于性生活过于频繁，流产次数较多或者慢性机械性刺激等^[2]。宫颈炎患者多具有白带增加、腰腹部疼痛、外阴部瘙痒等症状，对女性患者的日常生活会产生较大影响。文章将2018年1月至2019年12月于本院就诊的86例宫颈炎患者视为研究对象，根据临床研究的结果论述，评估联合使用左氧氟沙星与阿奇霉素治疗的效果，内容归纳如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2018年1月至2019年12月于本院就诊的86例宫颈炎患者视为研究对象，任意编号后纳入研究组与参照组(n=43)。研究组年龄23-54岁，均龄(39.62±11.14)岁。病程时间4个月-3年，平均时长(1.71±1.24)年。参照组年龄23-54岁，均龄(39.94±11.02)岁。病程时间4个月-3年，平均时长(1.64±1.29)年。两组基线数据比较无显著差距，可以划入两组观察比较(p>0.05)。

1.2 方法

参照组使用阿奇霉素治疗，0.5g/次，1次/d，餐前1h或者餐后2h服用。研究组联合使用阿奇霉素与左氧氟沙星治疗，上述治疗的同时，左氧氟沙星0.3g/次，2次/d，餐前1h或者餐后2h服用。两组患者均持续治疗14d。

1.3 评价标准

对比患者的治疗效果及恢复时间。痊愈表示患者症状消失，病原体检测结果为阴性，镜下白细胞低于30个；好转表示患者症状改善，镜下白细胞>30个；无效表示未满足上述条件(症状恢复率=痊愈率+好转率)^[3]。

1.4 统计学处理

SPSS20.0为数据整理工具，t检验计量性数据，计数材料x²计算，p<0.05有统计学意义。

2 结果

2.1 研究组与参照组患者的症状恢复率比较

研究组病患的症状恢复率是97.67%，参照组病患的症状恢复率是83.72%，研究组的恢复率更高(p<0.05)。详见表1

表1 研究组与参照组患者的症状恢复率比较

组别	痊愈(n)	好转(n)	无效(n)	症状恢复率(%)
研究组(n=43)	25	17	1	97.67
参照组(n=43)	14	22	7	83.72
x ²	-	-	-	7.51
p	-	-	-	0.000

2.2 研究组与参照组病患的症状恢复时间比较

研究组病患的症状缓解时间、宫颈修复时间均相对较短，与参照组时间指标对比有统计学意义(p<0.05)。详见表2

表2 研究组与参照组病患的症状恢复时间比较

组别	症状缓解时间(d)	宫颈修复时间(d)
研究组(n=43)	8.59±2.01	11.28±3.22
参照组(n=43)	12.43±2.59	26.48±4.76
t	9.11	14.03
p	0.000	0.000

3 讨论

宫颈炎为女性常见的疾病类型，主要的病原体是沙眼衣原体或者解脲脲原体^[4]。若未得到及时、有效的治疗，则可能在短时间内出现其他并发症，影响患者的身心健康。宫颈临床多以药物控制为主，阿奇霉素为常用的药物。作为大环内脂类药物，阿奇霉素能够对泌尿生殖系统中致病菌产生抑制效果，广谱抗菌、消炎。

左氧氟沙星为新型喹诺酮类抗菌药物，作为广谱抗菌药物，能够直接抑制细菌的繁殖，消除患者宫颈中病原体。左氧氟沙星口服后吸收效果较好，药物半衰期时间较长，在患者治疗的过程中，也可以根据患者的病情恢复效果而逐量增加或者减少药物使用剂量，更好的达到药物治疗效果。

本次临床研究的结果显示，研究组病患的症状恢复率是97.67%，参照组病患的症状恢复率是83.72%，研究组的恢复率更高。同时研究组病患的症状缓解时间、宫颈修复时间均相对较短，证实了联合使用左氧氟沙星与阿奇霉素的作用价值。相较于单独使用阿奇霉素治疗的方法，联合使用左氧氟沙星能够强化治疗的效果，避免病患症状的进一步发展，更好的达到药物控制效果。

综合上述内容，左氧氟沙星联合阿奇霉素治疗宫颈炎的效果较好，可快速改善患者的临床症状，提高患者的临床治疗有效率，建议临床中根据患者的临床表现合理选择，科学用药且控制药物剂量，快速改善宫颈炎患者的生活质量。

参考文献：

- [1] 赖六秀. 左氧氟沙星与阿奇霉素联合治疗宫颈炎患者的价值分析[J]. 基层医学论坛, 2019, 23(35): 5099-5100
- [2] 顾雅萍. 宫颈炎患者应用左氧氟沙星联合阿奇霉素治疗的效果分析[J]. 中国现代药物应用, 2019, 13(21): 160-161
- [3] 潘祖萍. 阿奇霉素联合左氧氟沙星治疗宫颈炎的临床疗效及其安全性[J]. 临床合理用药杂志, 2019, 12(30): 21-22
- [4] 王正玲. 左氧氟沙星联合阿奇霉素治疗宫颈炎效果及其炎症因子的影响[J]. 宁夏医科大学学报, 2019, 41(08): 830-833