

心血管内科护理风险分析与对策

杨成兰

(山东省肥城市桃园镇卫生院 山东 肥城 271609)

【摘要】目的: 心血管内科护理风险分析及对策分析。方法: 本次研究针对本院 2019 年 3 月-2019 年 7 月收治的心内科住院患者 88 例, 按照电脑随机分组法, 将其分为了对照组和实验组, 对照组患者采用常规化的护理干预措施, 实验组患者基于对照组基础上采用的风险干预管理, 对比差异性的干预后, 实验组和对照组患者的护理依从性, 患者的护理有效率。结果: 经过差异性的护理干预后, 实验组护理无效 2 例 (4.55%)、综合有效 42 例 (95.45%) 对照组护理无效 6 例 (13.64%)、综合有效 38 例 (86.36%), 对照组护理综合依从为 41 例 93.18%, 对照组为 35 例, 79.55%, 结论: 综上所述, 采用基于风险管理的护理干预, 能够提升心内科患者的护理有效率, 改善患者的护理依从性, 建议研究推广。

【关键词】心血管内科; 护理风险; 分析策分析

心血管内科是现代临床医学中高风险的科室之一, 为医院极为重要的科室, 因心血管内科疾病的特殊性, 护理难度极高, 稍微处理不善, 就会出现护理风险, 进而影响病患的治疗, 严重者还会危及病患生命安全, 该疾病具有多发性以及突变性的特点, 且致病因素较多, 病情突发性强, 容易产生并发症和不良医问题。加强心血管内科护理, 一方面也是医院建设发展的需要, 另一方面也是避免医院纠纷, 提升医药学服务的关键举措。相关研究表明, 针对心血管内科采用针对化护理干预, 能够提升护理管理质量, 提升患者护理满意率, 值得研究推广。本次研究针对本院收治的心血管内科护理患者进行研究分析, 对于优化心血管内科护理提出了对应的措施建议, 现将相关研究分析阐述如下。

1 一般资料与方法

1.1 一般资料

本次研究针对本院 2019 年 3 月-2019 年 7 月收治的心内科住院患者 88 例, 按照电脑随机分组法, 将其分为了对照组和实验组, 实验组 44 例患者基于对照组基础上采用的风险干预管理, 其中男性患者 29 例, 年龄为 31-65 岁, 平均年龄为 (58.3±3.25) 岁, 女性患者 15 例, 年龄为 37-75 岁, 平均年龄为 (53.6±2.58) 岁。

1.2 方法

对对照组患者采用常规化的心血管内科护理干预。

对实验组患者采用风险管理护理干预, 主要的护理措施有,

①加强对患者的健康知识宣传, 通过宣传栏, 专题讲座的方式, 为心血管内科患者营造一个积极, 健康, 科学的住院护理环境, 提升其疾病意识, 消除负面情绪。②做好风险管理, 心血管内科患者的自理能力差, 十分容易发生跌倒问题, 完善医院的防滑、防跌倒设施管理, 加固医院的病床脚刹、床挡设施, 摆放好医院的物品, 定期检查设备的灵敏度。③做好药物管理, 心血管内科患者的药物特殊, 护理人员要督查患者用药种类, 数量, 时间, 防止错误用药, 做好急救处理。④针对患者的不良情绪, 护理人员要及时和家属以及患者交流, 让患者放松心情, 积极配合护理。

1.3 观察指标

对比差异性的干预后, 实验组和对照组患者的护理依从性, 患者的护理有效率。

1.4 统计学分析

使用 SPSS22.0 统计学软件, 计数资料为 [n (%)], 予以 X² 检验, 计量资料为 (), 予以 t 检验。P 值 < 0.05 提示统计学意义成立。

2 结果

实验组护理无效 2 例 (4.55%), 综合有效率 42 例 (95.45%), 对照组护理无效 6 例 (13.64%), 综合有效 38 例 (86.36%), P=0.047, 实验组不依从 3 例 (6.82%), 综合依从率 41 例 (93.18%), 对照组不依从 9 例 (20.45%), 综合依从 35 例

(79.55%), (p<0.05)。

3 讨论

近年来, 随着我国工业化进程加快, 各类污染日益严重, 心血管内科疾病患病率有着明显升高的趋势, 心血管内科疾病种类非常多, 各类病症的严重程度也存在差异性, 不仅会提升病患的治疗难度, 护理难度也会相应提高, 在临床护理服务过程中, 极易出现各类护理风险事件, 使得病患治疗效果不甚理想。心血管内科患者病情特殊, 在护理过程中也容易发生不良事件, 在整个护理过程中, 建议医护人员提升护理警惕性, 通过药物管理, 护理管理, 细节管理的方式, 减少风险, 提升护理防控管理质量, 最大程度的提升护理管理质量。随着我国医疗水平不断提升, 对护理风险的不断系统分析, 发现, 造成心血管内科病患出现护理风险的主要因素分为病患自身、护理人员、护理制度三个方面, 针对病患自身方面, 护理人员应对病患形成一对一健康宣教及心理辅导, 不仅稳定好病患情绪, 还应提升病患认知度及依从性, 进而避免因病患而形成护理风险, 针对护理人员方面, 主要定期对其进行专业培训和考核, 提升护理人员防范意识和责任心, 杜绝因护理人员而形成的护理风险, 针对护理制度方面, 找出其中不足之处, 结合实际状况, 不断完善护理制度, 为病患提供优质的护理服务, 促进病患身体康复, 早日出院, 因此, 护理对策的运用价值极高, 值得选用。

综上所述, 通过对心血管内科护理风险系统分析, 制定护理对策并施行的效果显著, 与常规护理比较, 风险事件发生率更低, 病患满意度更高, 生活质量更好, 心血管内科护理中值得运用护理对策方案。

本次研究针对本院 收治的心内科住院患者 88 例, 按照电脑随机分组法, 将其分为了对照组和实验组, 对照组患者采用常规化的护理干预措施, 实验组患者基于对照组基础上采用的风险干预管理。以上结果可知, 经过差异性的护理干预后, 实验组护理无效 2 例 (4.55%)、综合有效 42 例 (95.45%) 对照组护理无效 6 例 (13.64%)、综合有效 38 例 (86.36%), 对照组护理综合依从为 41 例 93.18%, 对照组为 35 例, 79.55%, 综上所述, 采用基于风险管理的护理干预, 能够提升心内科患者的护理有效率, 改善患者的护理依从性, 建议研究推广。

参考文献:

- [1] 王玉美. 心血管内科护理不安全因素分析与防范对策 [J]. 齐鲁护理杂志, 2015, 21 (01): 75-76.
- [2] 杨福兵. 心血管内科护理管理中风险分析与安全对策 [J]. 中国卫生标准管理, 2015, 6 (04): 136-137.
- [3] 姜重燕. 心血管内科护理风险的分析和对策 [J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2015, 3 (03): 172-173.
- [4] 蔡丽梅. 心血管内科护理管理中风险因素分析及安全防范对策 [J]. 大家健康 (学术版), 2015, 9 (07): 194-195.
- [5] 徐振辉. 浅析心血管内科护理风险分析及对策 [J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2015, 3 (07): 177-179.