

妇产科保健门诊宫颈病变筛查的临床价值分析及对孕产妇围产结局的影响分析

窦慧珍 李宝霞 闫妮 王婧娟

(甘肃省静宁县妇幼保健院 甘肃 静宁 743400)

【摘要】目的：通过分析妇产科保健门诊宫颈病变筛查的临床价值，研究妇产科保健门诊宫颈病变筛查对于孕产妇围产结局产生的主要影响，总结一系列的妇产科保健门诊服务体会，全面提高妇产科保健门诊工作、宫颈病变筛查工作的质量。方法：从2019年8月-2020年8月间入我院进行妇产科常规保健的备孕女性中随机抽选100例作为主要的研究对象，利用随机分组法分成两组。对照组提供常规化的保健护理服务，实验组则增加宫颈病变筛查项目，观察比较两组孕产妇的围产结局，统计分析所有人员的妇产科保健门诊服务、宫颈病变筛查工作满意度。结果：实验组孕产妇生育质量、围产结局均优于对照组；实验组孕产妇妇产科保健门诊服务、宫颈病变筛查工作满意度均高于对照组，组间结果的差异性具有统计学意义($p<0.05$)。结论：妇产科保健门诊宫颈病变筛查工作的及时开展非常必要且关键，逐步提高农村妇女自我保健意识，全省妇女“两癌”防治知识知晓率达到80%以上。医疗人员的技术水平和服务质量进一步提高，承担农村妇女“两癌”检查人员培训覆盖率达到95%以上。不仅是改变孕产妇围产结局，提高孕产妇生育质量的关键所在，还有助于宫颈病变患者疾病治疗效果的优化，常见并发症发生率的降低，以及宫颈病变的快速康复，可谓一举数得，值得广泛推广。

【关键词】妇产科保健门诊；宫颈病变筛查；临床价值；孕产妇围产结局

引言

宫颈病变作为女性的常见疾病，极大地危害着女性身体健康，也严重影响着女性受孕，增加了女性分娩风险。调查结果显示，及时发现宫颈病变，并且展开有效治疗，对于女性受孕率、康复率的整体提升而言有着重要的影响，可以起到一定的保障作用。有效开展妇产科保健门诊宫颈病变筛查工作，为女性备孕、安全分娩、围产结局的改变提供有力的支持，具有重要的现实意义。基于此，本文特意研究了妇产科保健门诊宫颈病变筛查的临床价值，具体分析了这项工作对于孕产妇围产结局产生的实际影响，希望相关的报告内容，可以为其他的医务人员提供一些参考，进一步提升妇产科保健门诊服务水平、宫颈病变筛查结果准确率。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将100例准备受孕的女性作为主要的研究对象，利用随机分组法进行科学分组后，展开有效的调查研究，直接说明研究目的、实验意义、治疗计划、护理注意事项等，赢得患者及家属的充分信任，实现诊疗服务计划、护理干预计划的全面落实，避免引发医患纠纷^[1]。全部女性分组可知：对照组50名女性年龄在23-35岁之间，平均 (27.00 ± 0.98) 岁；实验组50名女性年龄在25-38岁之间，平均 (29.31 ± 1.44) 岁。派出经验丰富的医务人员，更好地开展妇产科保健门诊宫颈病变筛查工作，优质完成妇产科的常规保健任务，继而加快医院的现代化改革进程。

1.2 一般方法

对照组予以常规化的妇产科保健服务，实验组则增加宫颈病变筛查项目，流程为：采用TCT检测方式，收取患者宫颈的分泌物，按照相关规定进行一系列的处理操作，通过分析成分，观察细胞形态，得出准确的宫颈病变筛查结果。筛选出各项指标，然后比较围产结局，对比分析孕产妇剖宫产率，新生儿低血糖率，呼吸窘迫综合征发生率。

1.3 指标统计

比较分析对照组和实验组的TCT检查结果分布情况，统计研究两组孕产妇的围产结局。使用专业软件SPSS 23.0及时处理相关数据，计量资料实施卡方检验，以 $p<0.05$ 表示组间结果差异性的统计学意义。

2 结果

2.1 对照组以及实验组女性TCT检查结果，可见表1：

表1：TCT 检查结果

组别	例数	异常例数	检出率
对照组	50	5	10.24%
实验组	50	1	2.00%
χ^2		3.211	3.147
p		<0.05	<0.05

2.2 对照组以及实验组孕产妇的围产结局，可见表2：

表2：孕产妇围产结局

组别	例数	孕产妇剖宫产	新生儿低血糖	呼吸窘迫综合征
对照组	50	12 (23.96%)	4 (8.39%)	5 (10.26%)
实验组	50	3 (6.07%)	1 (2.11%)	0 (0.00%)
χ^2		4.928	4.977	4.910
p		<0.05	<0.05	<0.05

3 讨论

宫颈病变是由慢性妇科病、多次流产、药物滥用、阴道异物较多等原因导致的一种常见妇科疾病。宫颈病变不仅影响着女性的身体健康，也是导致女性受孕率低，无法安全分娩，巨大儿及呼吸窘迫综合征发生率较高的主要诱因。发生宫颈病变以后，患者阴道分泌物明显增多，味道、颜色等均有很大变化，必须进行及时检查、有效治疗。宫颈病变影响着孕产妇的围产结局，可能发展成为“宫颈癌”，严重危及到女性的生命安全。TCT检查是目前最先进、最有效的一种检查方式，宫颈异常细胞检出率较高，便于医生做出准确诊断，根据患者的宫颈病变情况，制定出科学合理、安全有效的治疗方案。坚持“早发现”“早治疗”“早康复”的原则，引导广大女性在备孕期间主动接受TCT检查，积极配合宫颈病变筛查工作的开展，同时加强她们的预后管理，降低新生儿低血糖发生率、呼吸窘迫综合征的发生率，体现出妇产科保健门诊服务水平，医院真正建立起良好的社会形象，具有非常重要的现实意义^[2]。

结束语

综上所述，必须加强妇产科保健门诊的宫颈病变筛查，引起更多人对于妇女保健、疾病筛查、安全分娩、常见疾病的关注及重视程度。妇产科保健门诊宫颈病变筛查对于孕产妇的围产结局有着积极影响，进行广泛推广、全面落实势在必行。

参考文献：

- [1] 徐梦泽, 李晓婷, 张春阳. 妊娠晚期孕妇产前筛查GBS感染临床价值及对妊娠结局的影响探讨[J]. 中国医疗器械信息, 2018, 35(23): 179-180.
- [2] 田英, 甄世萍. 孕期护理保健对100例孕产妇及围生儿临床结局的影响分析[J]. 中国妇产科临床杂志, 2019, 26(10): 245-246.