对肝胆术后发生胆瘘患者实施整体护理的效果分析

曾预晓

(重庆医科大学附属第二医院 重庆 400010)

【摘要】目的: 分析对肝胆术后发生胆瘘患者实施整体护理的效果。方法: 80例肝胆术后发生胆瘘患者摸球分对照、观察组, 对照组40例行常规护理, 观察组40例行整体护理, 分析治疗时间、护理满意度、疼痛评分。结果: 观察组引流时间和住院时间更短 ($P<0.05$); 观察组护理满意度更高 ($P<0.05$); 护理前无差异护理后观察组VAS评分更低 ($P<0.05$)。结论: 整体护理可缩短治疗时间并降低患者痛感, 同时提高其护理满意度。

【关键词】整体护理; 肝胆术后发生胆瘘患者; 护理效果

胆瘘是肝胆术后常见并发症, 严重影响患者术后恢复, 为改善患者术后恢复情况, 需引入科学的临床护理模式^[1]。基于医学专家研究分析, 常规护理已然无法满足要求, 需探究新型护理模式^[2]。通过分析肝胆术后发生胆瘘患者的身心状态和病情, 缩短治疗时间并降低患者痛感, 同时提高其护理满意度应为护理核心, 而整体护理的落实可满足护理要求。

1 资料和方法

1.1 基本资料

在2018-2019期间筛选符合诊断标准; 病历资料齐备; 病史清晰; 签署知情同意书的患者; 剔除有其他重大疾病或严重精神障碍的患者。选出的80例患者参与摸球, 对照组40例, 男女1:1; (46.15±3.55)岁。观察组40例, 男女1:1; (46.19±3.52)岁。组间资料对比, $P>0.05$ 。

1.2 操作方法

对照组: 常规护理, 遵医嘱辅助治疗过程, 给予患者体征监测和治疗指导。观察组: 整体护理: (1)心理疏导: 大多数肝胆术后胆瘘患者受病痛折磨而易发多种不良情绪, 轻则情绪不佳, 重则拒绝治疗, 严重影响治疗效果, 故护理人员应当与患者深入交流, 搞清楚产生不良情绪的原因, 积极介绍院内成功治疗案例, 以案例中患者为榜样给予患者积极的心理暗示。(2)知识宣教: 大多数患者并无专业医学知识, 道听途说易使其产生错误的治疗观念, 故护理人员应当通过科学教育纠正其错误观念, 通过分发手册、聊天谈心以及视频讲解等方式全面深化知识宣教成效, 尤其应对患者家属进行教育, 使其做好监督工作。(3)并发症护理: 每日检查患者的口腔、呼吸道有无异物, 如有异物及时清理, 在清理时应当动作轻柔, 小心谨慎, 不要让患者产生不适感, 根据患者疼痛情况予以针对性护理, 轻微疼痛患者采用注意力转移法缓解疼痛, 重度疼痛患者采用止痛药止痛。(4)环境优化: 干净整洁的环境可降低感染率, 故护理人员应全面优化患者的治疗环境, 病房每日消毒、通风和采光, 同时按照患者要求调整温度、湿度, 切勿使用刺激性香水喷洒病房, 房内也不能防止散发刺激性气味的植物。(5)生活指导: 指导患者保持良好的卫生习惯, 饮食后要漱口, 不食用辛辣、生冷等刺激性食物, 配合护理人员, 当出现咽喉不适、疼痛时及时告知护理人员。

1.3 观察指标

治疗时间: 包括引流时间和住院时间, 时间越短越好。

护理满意度: 包括非常满意、一般满意和不同意, 满意度计算包括非常和一般满意患者。

疼痛评分: VAS表, 分值与患者的疼痛感受正相关。

1.4 统计学处理

SPSS20.0处理计数(χ^2)和计量(T)资料, 差异显著($P<0.05$)。

2 结果分析

2.1 治疗时间

表1结果: 观察组引流时间和住院时间更短 ($P<0.05$)。

表1治疗时间记录表 [$\bar{x} \pm s$] (天)

组别	例数	引流时间	住院时间
观察组	40	2.72±1.19	4.26±0.27
对照组	40	4.56±1.41	8.18±1.31
T	-	6.3073	18.5358
P	-	0.0000	0.0000

2.2 护理满意度

表2结果: 观察组护理满意度更高 ($P<0.05$)。

表2护理满意度记录表 [n(%)]

组别	例数	非常满意	一般满意	不满意	满意度
观察组	40	24 (60.00)	15 (37.50)	1 (2.50)	39 (97.50)
对照组	40	15 (37.50)	15 (37.50)	10 (25.00)	30 (75.00)
χ^2	-	-	-	-	8.5375
P	-	-	-	-	0.0035

2.3 疼痛评分

表3结果: 护理前无差异护理后观察组VAS评分更低 ($P<0.05$)。

表3疼痛评分记录表 [$\bar{x} \pm s$] (分)

组别	例数	护理前	护理后
观察组	40	6.25±1.16	3.21±1.48
对照组	40	6.60±1.50	4.62±1.35
χ^2	-	1.1674	4.4516
P	-	0.2466	0.0000

3 讨论

上述分析提到, 肝胆术后发生胆瘘患者身心状态不佳和病情久拖愈重, 为缩短治疗时间并降低患者痛感, 同时提高其护理满意度, 护理工作应体现人本、科学护理思想, 给予患者良好的身心干预指导。常规护理内容单一且方法简单, 无法全面应对护理问题, 易发护理风险导致严重护理后果。对此, 引入整体护理势在必行。

该护理模式囊括心理疏导、并发症护理知识宣教、环境优化和生活指导, 是常规护理的升级和补充, 可全面提升护理质量。具体来说: 心理疏导能够改善患者不良情绪, 提高其治疗信心, 知识宣教可纠正患者错误的治疗观念, 提高其治疗依从性, 并发症护理可降低并发症发生率并降低患者痛感, 利于术后康复, 环境优化可降低感染率并提高患者舒适度, 生活指导可提高患者生活质量, 从生活方面保障治疗安全^[3-4]。总之, 以整体护理为主体, 各项临床护理措施联合应用, 即可有效改善患者生活质量并提高护理安全性。

综合上述数据, 观察组在治疗时间、护理满意度和疼痛评分方面均优于对照组, 由此可说明整体护理的巨大价值, 可缩短治疗时间并降低患者痛感, 同时提高其护理满意度, 值得推广使用^[5]。

参考文献:

- [1] 王成慧. 肝胆手术发生胆瘘的护理方法及效果 [J]. 中国卫生标准管理, 2018,009(015):189-190.
- [2] 张蕾. 分析整体护理对肝胆术后发生胆瘘患者的临床护理效果 [J]. 饮食保健, 2018,005(025):160.
- [3] 章一婵. 分析整体护理对肝胆术后发生胆瘘患者的临床护理效果 [J]. 健康前沿, 2019,028(005):150.
- [4] 李艺. 整体护理对肝胆术后发生胆瘘患者的临床护理效果研究 [J]. 世界最新医学信息文摘, 2018,18(52):108-108.
- [5] 陈晓燕. 整体护理对肝胆术后发生胆瘘患者的临床护理临床疗效观察 [J]. 实用临床护理学电子杂志, 2020,005(011):65.