

# 一种偏瘫患者用护理用偏瘫类型指示牌在临床静脉治疗中的应用

杨文晶 施学剑

(云南大学附属医院 云南 昆明 650000)

**【摘要】**脑卒中的致死和致残率相对较高,脑卒中所导致的偏瘫患者需要长时间的住院治疗,同时进行静脉治疗。在长时间的静脉治疗过程中,想要为患者提供更为精准有效的治疗方案,确保在静脉治疗过程中最大限度的减少患者的痛苦,除了需要护理人员具有较强的静脉输液技术之外,还需要结合一些外部工具来强化护理效果。本文通过分析一种偏瘫患者用护理用品类行指示牌在临床静脉治疗中的应用,来分析在偏瘫患者静脉治疗过程中这一指示牌的重要效用,为后续的护理工作质量提升打下良好基础。

**【关键词】**偏瘫;护理用;偏瘫类型指示牌;静脉治疗;应用

## 1 偏瘫患者静脉治疗中存在的不足

首先因为偏瘫患者的程患病度各有不同,其语言表达能力会受到直接影响,会出现口角歪斜,吞咽困难等状况,大部分患者都没有自理能力,病情恢复较慢,会对其造成心理上和身体上的双重影响。一些患者会对治疗丧失信心,也不愿配合静脉治疗;其次偏瘫患者大部分有一侧肢体偏瘫,在治疗过程中只能选择其健全的肢体进行静脉穿刺,因为要长期输液,在位置的选择和穿刺的难度上都有较高要求。除此之外,偏瘫患者因长时间卧床,其尿频现象较为明显,另受疾病的影响其个人意识相对模糊,下意识的肢体活动较多,如果因护理不到位或应对患者偏瘫位置掌握不足所选择静脉注射的位置不恰当,很可能会导致针头拔出形成胶贴脱落而渗液的风险。再有,偏瘫患者大部分为老年人,受年龄特征影响其血管会出现硬化,管壁变厚,管腔狭窄以及血管弹性差,脆性强的特点。老年人的肌肉相对松弛,血管较浅,很容易产生滑动,固定起来较为困难,比较容易穿破且回血较慢。另外因老年斑或色素沉着会影响血管的清晰度,除此之外老年患者的肺功能较差,也会因过快输液而导致心衰或水肿,这些情况都会直接影响偏瘫患者的静脉输液护理工作的质量。除了这些患者身体上的因素之外,在拔针后按压部位的不准确或病人情绪的急躁以及其健全肢体长期因输液而导致液体外渗等情况,都会直接影响静脉治疗的质量。通过以上问题分析可以得知,目前影响偏瘫患者静脉治疗质量的关键在于确定其身体各位置的具体情况,有针对性的结合肢体状态选择科学合理的静脉注射方法和位置。在这种情况下,一种偏瘫患者用护理用偏瘫类型指示牌的作用就比较明显,能够提升治疗和护理的效果,为护理人员的工作开展起到重要的辅助作用<sup>[1]</sup>。

## 2 偏瘫患者护理用偏瘫类型指示牌的主要作用

偏瘫患者护理用偏瘫类型指示牌,其主体包括不透明的指示牌本体,指示牌本体的顶部固定有挂环,指示牌本体上开有透明的偏瘫类型指示窗,偏瘫类型指示窗为人体形状,偏瘫类型指示窗的底部设有偏瘫类型设置按键和电源开关按键,偏瘫类型设置按键包括右交叉偏瘫按键、左交叉偏瘫按键、右侧偏瘫按键、左侧偏瘫按键、右下瘫痪按键、左下偏瘫按键、右上偏瘫按键和左上偏瘫按键。该指示牌可悬挂固定于病人的病服上,其可根据病人偏瘫类型进行调节指示,并可在夜间护理时清楚看到该病人的偏瘫类型;该指示牌可重复使用,节约护理成本。

## 3 偏瘫患者护理用偏瘫类型指示牌的应用对策

### 3.1 根据患者情况作出标识 便于后续静脉治疗

在应用偏瘫类型指示牌进行护理工作时,首先护理人员要预先与病人建立良好的护患关系,以真诚和耐心和学生沟通,让学生了解自身的病情,并愿意和护理人员说明自身的身体和心理状况。在沟通的过程中,护理人员要结合学生的身心发展状况以及病例实际来设定偏瘫患者用护理用偏瘫类型指示牌。在开展静脉输液护理工作时要根据学生的实际情况对其作出标

识,在不透明的指示牌当中标明偏瘫患者的类型,按照指示牌的人体形状分别设置不同位置的偏瘫按键,并将其固定于病人的病服上。可以按照患者患病类型调节相应的指示牌以此来明确学生的身体状况,同时标明学生偏瘫的具体位置,这样不仅能够方便后续的静脉治疗,同时也利于不同班组的护理人员对学生能够有更为深入的了解<sup>[2]</sup>。

### 3.2 结合标识展开静脉治疗 确保治疗符合学生病情

在全面了解学生的病情输入的药物以及身体偏瘫的状况过程中,护理人员要根据学生的实际情况选择合适的血管和静脉注射方式,偏瘫患者一般采用健侧肢体输液,因为其患侧肢体受瘫痪肌肉的影响活动相对较少,肌肉难以对静脉形成挤压作用会产生静脉回流的障碍,另外因为长久的输液会使学生肢体处于被动状况让其放弃了主动运动锻炼和被动运动锻炼的机会,会因此错过最佳的康复时机。所以在静脉治疗过程中,一般都采取对学生健侧肢体进行有计划的静脉输液来进行治疗,因为健侧肢体的肌肉活动相对正常,通过健康肌肉的挤压能够促进静脉回流,提高其回流速度,减少 $\text{CO}_2$ 、 $\text{H}^+$ 及组胺的堆积,会由此有效的防止渗漏情况的出现。所以在静脉治疗过程中,护理人员要结合标识展开静脉治疗工作,要按照标识所标注学生肢体的健康及患处的区分来展开来进行输液,保证所选择的静脉注射方式能够符合学生的病情<sup>[3]</sup>。

### 3.3 按照标识进行日常护理 提高静脉治疗效果

在静脉治疗过程当中,护理人员要加强护理巡视,随时观察学生肢体状况,结合标识牌来关注学生穿刺皮肤和肢体位置是否符合其偏瘫四肢位置。另外要确定输液管是否有扭曲受压,除此之外要观察输液滴数是否适宜,如果发现异常要及时处理。另外,要注意观察学生的静脉注射体位,如果其身体位置和偏瘫患者护理用偏瘫类型指示牌所标注的有出入,要及时核对,确保学生能够更为顺畅的接受静脉治疗,以此来提高静脉治疗的效果。

## 4 结论

静脉治疗是现在临床医学治疗领域当中较为常用的治疗手段,偏瘫患者的住院时间相对较长,年龄比较大,需要输液的时间也较多。所以在静脉治疗过程中,要结合偏瘫学生的实际情况来开展治疗工作,偏瘫患者护理用偏瘫类型指示牌能够帮助护理人员更为明显的区分学生的肢体健康状况,结合专业技术操作根据学生的实际情况展开针对性的静脉治疗,以此来强化服务质量,提高静脉治疗效果。

## 参考文献:

- [1] 冯少岩.急性缺血性脑卒中病人急诊静脉溶栓干预措施及效果评价[J].临床医药文献电子杂志,2019(62):12-13.
- [2] 朱余春,夏爱波.静配中心中药注射剂用药医嘱存在问题分析[J].北方药学,2019(05):34-35.
- [3] 有曼,何广宏,陈洁,曹鹏飞.静配中心规范化管理对降低中药注射剂不良反应发生率的作用[J].临床研究,2019(02):15-17.