

化疗护理流程在肿瘤科患者化疗中的应用效果观察

秦白俐

(建湖县人民医院 江苏 盐城 224700)

【摘要】目的：在肿瘤科患者化疗工作中使用化疗护理流程，并对其产生的作用进行研究与分析。方法：随机从我院肿瘤科抽选出42名需要接受化疗的患者进行研究，抽选时间2019年4月~2020年11月，依据数字随机表内容将其划分至X组（观察组）与Y组（对照组），每21名患者被划分至一组。X组患者接受化疗护理流程内容，Y组患者接受常规护理内容。将X组与Y组患者满意表现、生活表现进行比较。结果：对比X组与Y组患者满意表现差异，整理X组患者护理评价调查内容得出其满意表现结果为 (92.68 ± 5.20) 分；整理Y组患者护理评价调查内容得出其满意表现结果为 (83.65 ± 6.72) 分；X组患者满意表现相较Y组更优，差异有统计学意义 $(P < 0.05)$ 。接受护理工作后，对X组患者生活表现进行检测工作得出其评分结果为 (88.92 ± 4.45) 分；对Y组患者生活表现进行检测工作得出其评分结果为 (81.31 ± 4.54) 分；X组患者生活表现评分相较Y组更高，差异有统计学意义 $(P < 0.05)$ 。结论：对肿瘤科化疗患者实施化疗护理流程内容能够提升患者护理体验，并帮助患者改善其生活表现，使得患者生活水平得以提升。

【关键词】化疗患者；满意表现；肿瘤科；生活表现；化疗护理流程

肿瘤科患者大多需要接受化疗工作，即为预防患者癌细胞向外扩散对患者进行化学药物给予操作。但是在治疗工作中，化学药物的使用能够对患者产生一定损害作用，长时间接受化学药物治疗工作患者容易患上并发疾病症状，不利于患者化疗工作顺利开展。为降低患者受损程度，本文将对我院42名肿瘤科化疗患者进行化疗护理流程应用价值研究工作，具体内容如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机从我院肿瘤科抽选出42名需要接受化疗的患者进行研究，抽选时间2019年4月~2020年11月，依据数字随机表内容将其划分至X组（观察组）与Y组（对照组），每21名患者被划分至一组。X组患者平均 (46.23 ± 3.72) 岁；Y组患者平均 (46.64 ± 3.86) 岁。两组患者一般资料差异无统计学意义 $(P < 0.05)$ 。

1.2 方法

本次研究Y组患者接受常规护理内容。X组患者接受化疗护理流程内容，具体如下：

(1) 化疗前。为患者进行科室构成、科室工作人员组成等信息讲解工作，帮助患者更快适应住院生活，降低患者对治疗患者的陌生程度^[1]。通过面对面形式为患者讲解化疗工作基础内容并强调治疗期间患者所需给予配合行为，使得患者能够对护理人员产生更多信任^[2]。针对部分紧张过度的患者，护理人员需要使用坚定的话语对患者讲解治疗工作所具有的优势，以提升患者接受治疗工作的信心。

(2) 化疗期间。严格遵从医嘱内容对患者进行给药操作，如果患者需要接受联合药物治疗工作，则需要合理指导进行正确药物给予程序，并对患者仔细讲解部分特殊药物的使用方法。对患者进行PICC置管操作前护理人员需要使用肥皂水对患者需要接受穿刺操作的上肢部位进行清洗操作。进行适量肝素盐水准备工作，选择患者适宜接受穿刺的操作的静脉，严格执行医院消毒操作程序，置管后对管道进行相应固定操作，并在其后24小时内容对患者进行密切关注，以便及时发现患者置管异常现象^[3]。对患者进行注射给药操作时，所使用的注射器不能够小于20毫升。

(3) 化疗后。患者接受化疗工作后，嘱咐喊着加强自身卫生管理工作，进食前后都需要进行漱口行为，并定期对患者皮肤进行清洁操作，清洁后擦干多余水分，使得患者皮肤保持干燥状态^[4]。对患者接受穿刺操作的一侧上肢进行查看，并询问患者是否具备疼痛感知。如果患者护理期间出现呕吐等不适表现，护理人员需要遵从医嘱内容对患者进行镇吐药物给予工作，护理期间还将对患者饮食内容进行干预^[5]。

1.3 观察指标

根据X组与Y组患者生活内容对其质量进行检测得出患者生活表现评分，收集X组与Y组患者对护理工作的满意表现，评分数值与患者满意表现、生活表现呈正比关系。

1.4 统计学方法

使用SPSS24.0统计软件对相应数据进行计算， $P < 0.05$ 时该差异具有统计学意义。

2 结果

对比X组与Y组患者满意表现差异，整理X组患者护理评价调查内容得出其满意表现结果为 (92.68 ± 5.20) 分；整理Y组患者护理评价调查内容得出其满意表现结果为 (83.65 ± 6.72) 分；X组患者满意表现相较Y组更优，差异有统计学意义 $(P < 0.05)$ 。接受护理工作后，对X组患者生活表现进行检测工作得出其评分结果为 (88.92 ± 4.45) 分；对Y组患者生活表现进行检测工作得出其评分结果为 (81.31 ± 4.54) 分；X组患者生活表现评分相较Y组更高，差异有统计学意义 $(P < 0.05)$ 。详细情况见表1。

表1：X组与Y组患者生活表现、满意表现差异比较（分）

组别	例数	满意表现评分	生活表现评分
X组	21	92.68 ± 5.20	88.92 ± 4.45
Y组	21	83.65 ± 6.72	81.31 ± 4.54
P		< 0.05	< 0.05

3 讨论

肿瘤科患者大多需要接受化疗工作，即为预防患者癌细胞向外扩散对患者进行化学药物给予操作。为降低化学药物对患者产生的损害，医院需要提升相应护理工作水平，从而改善患者临床表现。经上述研究表明，对肿瘤科化疗患者实施化疗护理流程内容能够提升患者护理体验，并帮助患者改善其生活表现，使得患者生活水平得以提升，因此化疗护理流程对肿瘤科化疗患者具有较高的应用价值。

参考文献：

- [1] 陆红燕. 护理流程在肿瘤科患者化疗中的应用与观察[J]. 当代临床医刊, 2019, 32(05): 449+446.
- [2] 于海洪. 化疗护理流程在肿瘤科患者化疗中的应用效果观察[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2019, 4(27): 126+139.
- [3] 顾云娇. 化疗护理流程在肿瘤科患者化疗中的应用效果分析[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2018, 3(42): 42.
- [4] 郑明秀. 化疗护理流程在肿瘤科患者化疗中的应用效果观察[J]. 航空航天医学杂志, 2018, 29(06): 764-765.
- [5] 赵锦会. 化疗护理流程在肿瘤科患者化疗中的应用效果分析[J]. 河北医学, 2017, 23(07): 1214-1217.