

需长期行静脉输液治疗患者发生静脉损伤后的护理要点

黄正容 黄德荣 蒋志容 邓钰^{通讯作者}

(西南医科大学附属中医医院 四川 泸州 646100)

【摘要】目的:对具备静脉损伤表现的静脉输液患者进行分析,得出此类患者的护理对策内容。方法:随机中我院需要长期接受静脉输液治疗工作的患者中抽选出42名具备静脉损伤表现的患者进行研究,抽选时间2019年1月~2020年12月,依据数字随即表内容将其划分至X组(观察组)与Y组(对照组),每21名患者组成一组。X组患者接受护理对策内容,Y组患者接受常规护理内容。将X组与Y组患者疗效表现、护理评价进行比较。结果:对比X组与Y组患者疗效表现与护理评价,X组患者表现结果相较均更优,差异有统计学意义($P<0.05$)。结论:护理对策内容的实施,能够有效提升护理水平使得患者静脉损伤表现得以改善,并提升护理质量使得患者具备更为舒适的护理体验,对静脉损伤患者具有较高应用价值。

【关键词】护理对策;静脉输液治疗;应用价值;静脉损伤患者

针对部分需要长期接受治疗工作的患儿而言,静脉输液是一类较为常见的治疗方式,但是长期接受静脉穿刺操作将会导致患者出现静脉损伤表现,不利于患者恢复健康状况。为改善患者静脉损伤表现,本文将对我院42名静脉损伤患者进行护理对策内容应用价值研究工作,具体研究内容与研究结果报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机中我院需要长期接受静脉输液治疗工作的患者中抽选出42名具备静脉损伤表现的患者进行研究,抽选时间2019年1月~2020年12月,依据数字随即表内容将其划分至X组(观察组)与Y组(对照组),每21名患者组成一组。X组男女比例表现为14:7,计算得出其平均(52.42 ± 4.56)岁;Y组男女比例表现为14:7,计算得出其平均(53.01 ± 5.52)岁。两组患者一般资料差异无统计学意义($P>0.05$)。

1.2 方法

护理对策内容

(1) 静脉炎患者。由于患者长期接受静脉输液治疗工作,患者静脉出现炎症表现的一类患者,患上此类疾病后人体静脉血管通道将会变窄,导致患者血液流通速度变慢,且患者手臂将会出现索状红线,走向与患者静脉走向一致。对比护理期间需要避免对该条静脉进行再次静脉穿刺操作,是对患者使用硫酸镁药物(规格为33%),对准患者静脉损伤血管进行湿热敷操作,从而使得患者血管痉挛症状得以改善。待患者血液循环功能得以改善后,选择浓度为75%的酒精对患者进行湿敷操作,从而使得患者皮肤温度得以降低,缓解患者疼痛感知。

(2) 药液外渗患者。针对此类患者除去上述湿热敷操作外,还需要对患者实施红外线照射操作,并对患者具有肿块表现的部位进行相应按摩工作,从而改善患者受损部位色素沉积表现^[1]。

(3) 瘢痕患者。对患者具有瘢痕表现的部位涂抹相应药物,并对其实施按摩操作。

(4) 感染患者。在进行静脉给予药物配置、静脉穿刺等操作时,护理人员需要严格执行医院相关消毒规定内容,保证上述操作均遵循无菌操作原则,从而降低患者出现感染表现的概率^[2]。

(5) 心理护理。为患者讲解静脉损伤原因,使得患者对自身患病状况具备一定了解^[3]。告知患者静脉损伤治疗方法,并对治疗期间患者所需配合的内容进行强调,有助于后续治疗工作有序开展。对患者讲述接受治疗工作后静脉恢复健康的病例信息,提升患者对治疗工作的信心并改善患者情绪表现^[4]。患者接受静脉给药期间,叮嘱患者对药液剩余状况进行密切关注,并注意保证给药一侧手臂处于较为稳定的状态,患者不能够进行大幅度运动,避免患者出现药液渗出现象。

1.3 观察指标

(1) 疗效表现判断标准:①显效,患者接受穿刺操作部位疼痛感知消失,静脉受损部位皮肤恢复正常;②有效,患者接

受穿刺操作部位相较护理前疼痛感知程度显著下降,且静脉损伤部位皮肤改善效果显著;③无效,患者不属于上述两类疗效表现类型。显效与有效均属于总有效内容^[5]。

(2) 收集X组与Y组患者对护理工作的评价内容,评分数值与患者认可表现呈正比关系。

1.4 统计学方法

本次研究所采集数据统一输入使用SPSS24.0统计学软件进行计算处理工作,计算结果显示 $P<0.05$ 时,该差异有统计学意义。

2 结果

2.1 对比X组与Y组患者疗效表现差异

X组中疗效表现属于总有效内容的患者共有20名,在该组中的占比状况为95.24%;Y组中疗效表现属于总有效内容的患者共有17名,在该组中的占比状况为80.95%;X组患者表现结果相较更优,差异有统计学意义($P<0.05$)。详细情况见表1。

表1: X组与Y组患者疗效表现差异比较[n, (%)]

组别	例数	显效	有效	无效	总有效
X组	21	15 (71.43)	5 (23.81)	1 (4.76)	20 (95.24)
Y组	21	6 (28.57)	11 (52.38)	4 (19.05)	17 (80.95)
P					<0.05

2.2 患者护理评价比较

对比X组与Y组患者护理评价,整理X组患者给予护理工作的评价内容得出其整体评分结果为(96.14 ± 2.05)分;整理Y组患者给予护理工作的评价内容得出其评分结果为(82.11 ± 3.62)分;X组患者给予评分结果显著高于Y组,差异有统计学意义($P<0.05$)。

3 讨论

静脉输液治疗是医学临床较为常见的药物治疗方式,但是长期接受该项治疗工作容易导致患者静脉受损,因此需要改善相应护理工作从而保证患者健康。经上述研究表明,护理对策内容的实施,能够有效提升护理水平使得患者静脉损伤表现得以改善,并提升护理质量使得患者具备更为舒适的护理体验,对静脉损伤患者具有较高应用价值。

参考文献:

- [1] 金晓岚. 防范静脉输液护理纠纷的对策分析[J]. 人人健康, 2020(14):573.
- [2] 王迎迎. 探讨需长期行静脉输液治疗的患者发生静脉损伤后护理对策及其效果[J]. 临床医药文献电子杂志, 2019,6(80):107-108.
- [3] 蔡义美. 对静脉输液治疗患者发生静脉损伤后的护理对策探讨[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2019,4(36):22.
- [4] 曹艳, 刘小艳. 对静脉输液治疗患者发生静脉损伤后的护理对策探讨[J]. 中西医结合心血管病电子杂志, 2018,6(21):120+122.
- [5] 杨淑娟. 需长期行静脉输液治疗患者发生静脉损伤后的护理对策探讨[J]. 中外医学研究, 2017,15(03):68-69.