

提高手术室护理安全中手术室细节护理的价值分析

李 月 高清梅

(新疆维吾尔自治区巴音郭楞蒙古自治州人民医院手术室 新疆 库尔勒 841000)

【摘 要】目的:探讨手术室细节护理在提高手术室护理安全中的应用价值,为手术室护理有效实施提供参考。方法:择取2021年1月25日~2021年8月25日期间在我院手术室进行治疗的7500例患者为对象,按照住院单双号将其分为两组,即参照组(n=3750例)与研究组(n=3750例)。其中,参照组患者手术室治疗期间给予常规护理,而研究组患者在此基础上给予手术室细节护理,对比分析两组患者护理措施应用价值。结果:研究组患者护理风险总发生率2/3750(0.05%)低于参照组16/3750(0.43%),且组间数据差异明显(X2=10.915,P=0.001)。结论:手术室细节护理在提高手术室护理安全中的应用价值明显,在临床上值得应用与推广。

【关键词】手术室细节护理; 护理安全; 护理风险

手术室作为医院的核心技术部门,是患者进行手术治疗与 抢救的重要场所^[1]。由于手术治疗本身具有侵入性,加上医院 管理及护理操作存在不当等情况,可造成患者术后并发症发生 风险,大大影响患者手术治疗效果及预后。因此,重视手术室 护理安全管理十分重要。而手术室细节护理从细微之处出发, 对患者展开精细化的护理工作,所取得的效果显著。鉴于此, 此次研究旨在手术室细节护理在提高手术室护理安全中的应用 价值,具体内容如下:

1 资料与护理方法

1.1 一般资料

择取 2021 年 1 月 25 日~ 2021 年 8 月 25 日期间在我院手术室治疗的 7500 例患者为对象,按照住院期间护理方式不同,将其分为参照组(n=3750 例)与研究组(n=3750 例)。其中,参照组入选患者中男 1965 例,女 1785 例;年龄 22-64 岁,平均年龄为(37.33 \pm 10.19)岁;研究组入选患者中男 1963 例,女性 1787 例;年龄为 23-65 岁,平均年龄为(37.30 \pm 11.15)岁;两组患者性别等基本资料组间比较差异,符合此次研究要求(P > 0.05),可比较。

纳入标准:①均在我院门诊检查,符合手术治疗指征,且给予护理干预;②可完整收集到患者所有的临床检查资料、手术治疗资料及护理资料;③参与患者均在手术前自愿签订知情同意书后正式加入。

排除标准:①合并严重精神类疾病或无法正常交流者;② 手术禁忌症者;③有凝血功能及感染高危因素及营养不良者; ④临床资料不全者^[2]。

1.2 护理方法

参照组患者手术治疗期间给予常规护理,主要内容为:护理人员主动告知入手术室前准备工作与注意事项,并简单介绍手术操作步骤及护理干预相应措施等。而研究组患者在此基础上给予手术室细节护理,主要内容为:患者手术开始前,护理人员主动了解患者病情,看其是否存在药物过敏史、手术禁忌症等,确认患者信息之后告知患者手术流程及相关注意事项、麻醉方式等,对患者术前心理状态评估与针对性疏导,让患者以积极的心态面对手术治疗。其次,在手术操作过程中护理人员紧密配合医生,做好手术器械安全、快速传递,药物的及时配置,密切观察患者心率、血压等指标的变化,同时注意患者术中有效遮盖患者的隐私部位,并做好术中保温工作。对患者手术过程中术野外的呕吐物、血迹等要及时清理,对使用后的手术器械,纱布严格按照要求整理摆放及清点,避免发生遗漏。最后,与病房护理人员做好交接工作及相关注意事项即可。

1.3 观察指标

观察与记录比较两组患者手术室护理期间所存在的护理风险,主要包括消毒隔离不达标、器械准备管理不当、麻醉管理 不到位、设备管理不到位。

1.4 统计学分析

此次课题研究中组间数据分析采用临床医师统计学助手 V10.1 注册版,其中涉及到计数资料用%示,以 X² 检验,当 P < 0.05 时,表示差异具有统计学意义。

2 结果

所有患者手术期间给予护理干预后,研究组患者手术室护理风险总发生率 2/3750 (0.05%) 低于参照组 16/3750 (0.43%),且组间数据差异明显 (P < 0.05),如表 1。

3 讨论

近年来,随着人们生活水平的提升、高负荷工作压力、不良饮食习惯及遗传等诸多因素的影响,导致需要手术治疗的患者增多^[3]。而手术室是医院重要的组成部分,主要对患者进行手术治疗及抢救工作 ^[4]。由于患者手术治疗本身具有风险性,加上患者在手术治疗过程中血管、内脏等组织与器官充分暴露于室内,极易将细菌从切口带入患者体内,这不但会引发患者发生感染,还大大影响手术的治疗效果。由此,提高手术室护理工作质量十分重要。而手术室细节护理是新型护理方式,与常规护理内容不同,可从细微之处将工作做好、做精,为患者提供体贴、细致及周围的人性化服务,可有效规避手术室护理风险事件发生。在此次研究中显示,研究组患者采取手术室细节护理后护理风险总发生率低于参照组,这与相关学者研究部结果一致 ^[5]。

综上所述,手术室细节护理在提高手术室护理安全中的应 用价值明显,不但提高手术护理效果,还有效规避护理风险发 生,值得在临床上优选。

参考文献:

[1] 廖菲. 手术室细节护理在提高手术室护理安全性中的应用效果分析[]]. 糖尿病天地, 2021, 18(6):220.

[2] 查建华. 手术室细节护理在确保手术室护理安全中的应用价值分析 [J]. 医药前沿, 2018,8(22):264.

[3] 童秋琴,罗翠玲,邹密.手术室细节护理在提高手术室护理安全性中的应用效果分析[J].中国卫生标准管理,2017,8(16):161-162.

[4] 刘雪梅. 手术室细节护理在提高手术室护理安全性中的作用效果观察及有效性分析 [I]. 糖尿病天地,2020,17(4):232.

[5] 廖昌丽,袁中岳,骆雪琴.细节护理在确保手术室护理安全中的应用效果分析[]].中国伤残医学,2020,28(8):88-89.

表1两组患者护理风险事件发生情况[n(%)]

组别	例数	消毒隔离不达标	器械准备管理不当	麻醉管理不到位	设备管理不到位	总发生率
参照组	3750	6 (0.16)	4 (0.11)	3 (0.08)	3 (0.08)	16 (0.43)
研究组	3750	1 (0.03)	0 (0.00)	0 (0.00)	1 (0.03)	2 (0.05)
X^2	_	_	_	_	_	10.915
P	_	_	_	_	_	0.001