

干扰素栓联合阿奇霉素对衣原体、支原体性宫颈炎的临床效果评价

陈俊霞

(通化县快大茂镇中心卫生院 吉林 通化 134100)

【摘要】目的：研究在衣原体以及支原体性宫颈炎治疗过程当中，采取干扰素栓联合阿奇霉素的治疗效果情况。方法：选取2020年4月-2020年12月在我院就诊的120例宫颈炎患者作为研究对象，将其进行随机平均分组，将其分为研究组与对照组各60例患者，分别采取干扰素栓联合阿奇霉素以及阿奇霉素治疗方法，观察两组患者经过治疗后的治疗效果情况以及支原体与衣原体转阴的时间。结果：对照组治疗总有效患者人数为40例，占比66.67%；研究组治疗总有效患者人数为59例，占比98.33%，研究组患者治疗总有效人数以及占比均高于对照组患者（ $P < 0.05$ ）。研究组患者衣原体以及支原体转阴的总治疗时间为（ 9.23 ± 2.21 ）d，观察组患者衣原体以及支原体转阴的总治疗时间为（ 12.69 ± 2.58 ）d，研究组患者总衣原体以及支原体转阴的总治疗时间少于对照组（ $P < 0.05$ ）。结论：对于患有衣原体、支原体性宫颈炎疾病的患者，在治疗的过程当中采取干扰素联合阿奇霉素治疗的方式，可以有效的提高患者的治疗效果，并且帮助患者恢复到正常的健康情况，具有重要的意义，可以将其应用到临床治疗当中。

【关键词】宫颈炎；干扰素；阿奇霉素；衣原体；支原体

支原体属于原核微生物的一种，衣原体属于革兰阴性菌的一种，并且两种菌种都是引发患者患有宫颈炎的主要原因。宫颈炎在育龄期妇女中发病率较高，也是最为常见的一种疾病，患者患有宫颈炎的临床症状表现为碰触性疼痛、宫颈伴有出血的情况、脓性白带等，对于患者的日常生活、以及身体健康都造成了不利的影响。提高宫颈炎患者在临床中的治疗效果是非常重要的，本次研究采用干扰素以及抗生素联合治疗的方式，并且取得了非常好的治疗效果，具体试验结果如下：

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年4月-2020年12月在我院就诊的120例宫颈炎患者作为本次试验研究对象，将其采取随机分组的方式进行，将其分为研究组与对照组各60例患者。其中患者年龄最小的为28岁，患者年龄最大的为54岁，平均年龄为（ 36.25 ± 3.26 ）岁。对比患者的年龄等临床资料（ $P > 0.05$ ）。

1.2 方法

对照组采取阿奇霉素分散片（生产企业：西安利君精华药业有限责任公司、国药准字H20113219）治疗，患者一日两次进行口服治疗，每次口服的剂量在250mg。

研究组采取干扰素栓联合阿奇霉素（生产企业：国药集团汕头金石制药有限公司、国药准字H20059064）治疗，阿奇霉素服用的方式与对照组相同，但是要干扰素栓放置于阴道内，并且一日一次，每次放置一枚，并且在放置前清洗阴部。

两组患者的治疗时间为一周。

1.3 观察指标

将患者的治疗效果分为三种：显效、有效、无效。显效：患者在进行治疗的过程当中临床症状均消失，检验结果已经达标；有效：患者在临床症状方面均得到了改善，并且检验结果部分已经达标；无效：患者临床症状没有得到改善，并且检验结果未达标。

1.4 统计学分析

本组研究采用SPSS 24.0统计学软件进行数据的分析和处理，计数资料采用[n(%)]表示，采用 χ^2 检验，计量资料采用均数±标准差（ $\bar{x} \pm s$ ）表示，采用t检验， $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 研究组与对照组患者治疗效果对比情况

对照组治疗总有效患者人数为40例，占比66.67%；研究

组治疗总有效患者人数为59例，占比98.33%，研究组患者的治疗情况明显优于对照组患者（ $P < 0.05$ ）。

2.2 研究组与对照组患者的临床指标对比情况

研究组患者衣原体以及支原体转阴的总治疗时间为（ 9.23 ± 2.21 ）d，观察组患者衣原体以及支原体转阴的总治疗时间为（ 12.69 ± 2.58 ）d，研究组患者总衣原体以及支原体转阴的总治疗时间少于对照组（ $P < 0.05$ ）。

3 讨论

衣原体以及支原体是导致人体发生感染的主要病菌，并且在进行衣原体以及支原体的疾病过程当中，治疗的难度相对较大。对于女性患者来说，如果感染了两种病菌就会引发生殖系统方面的疾病，其中最为常见的生殖系统疾病为宫颈炎。当患者感染衣原体以及支原体病菌后，会出现腰部酸痛、腹部不适的症状，如果患者在患病后不能第一时间进行治疗，在一定程度上会导致病情的加重，从而引发盆腔炎症，对于患者日常生活以及生活治疗产生影响，因此在患有衣原体以及支原体感染的宫颈炎，要第一时间进行治疗。

在本次试验研究当中，对照组治疗总有效患者人数为40例，占比66.67%；研究组治疗总有效患者人数为59例，占比98.33%，研究组患者的治疗情况明显优于对照组患者（ $P < 0.05$ ）。研究组患者衣原体以及支原体转阴的总治疗时间为（ 9.23 ± 2.21 ）d，观察组患者衣原体以及支原体转阴的总治疗时间为（ 12.69 ± 2.58 ）d，研究组患者总衣原体以及支原体转阴的总治疗时间少于对照组（ $P < 0.05$ ）。

综上所述，对于患有衣原体、支原体性宫颈炎疾病的患者，在治疗的过程当中采取干扰素联合阿奇霉素治疗的方式，可以有效的提高患者的治疗效果，并且帮助患者恢复到正常的健康情况，具有重要的意义，可以将其应用到临床治疗当中。

参考文献：

- [1] 程昌功. 阿奇霉素和交沙霉素分别联合干扰素栓治疗支原体、衣原体性宫颈炎的疗效对比观察[J]. 医学信息, 2019, 22(2): 220-221.
- [2] 刘静, 汪高芝. 干扰素栓联合阿奇霉素治疗衣原体、支原体性宫颈炎的临床效果[J]. 临床医学研究与实践, 2018, 2(30): 98-99.
- [3] 付艳玲. 阿奇霉素联合干扰素栓对衣原体、支原体性宫颈炎患者临床疗效及不良反应的影响[J]. 中国实用医药, 2018, 13(24): 114-115.