

盐酸左氧氟沙星治疗盆腔炎的效果观察及价值体会

陈俊霞

(通化县快大茂镇中心卫生院 吉林 通化 134100)

【摘要】目的：研究盐酸左氧氟沙星治疗盆腔炎的效果观察及价值体会。方法：选取2020年2月-2020年9月在我院就诊并且接受治疗的100例盆腔炎患者，将其进行随机平均分组方式，分为对照组50例患者，研究组50例患者，对照组采取氧氟沙星治疗、研究组采取盐酸左氧氟沙星治疗，对比两组患者的治疗效果、以及不良反应发生率情况。结果：研究组患者治疗总有效率高于对照组患者($P < 0.05$)。研究组患者出现不良反应情况人数以及占比均少于对照组($P < 0.05$)。结论：在治疗治疗盆腔炎患者中，采用盐酸左氧氟沙星治疗，可以有效的提高患者的治疗效果，以及减少患者的不良反应发生率情况。

【关键词】盐酸左氧氟沙星；盆腔炎；治疗效果

患者盆腔出现炎症会导致盆腔炎的出现，如果患者患有盆腔炎不得到有效的治疗，或者患者在进行治疗后，病情没有得到有效的治疗，就会导致患者出现慢性盆腔炎，并且随着患者病程时间的增长，也给治疗增加了非常大的难度。患者在患有盆腔炎症病后会伴有白带增多的情况，并且小腹也会出现疼痛，如果病情没有得到及时治疗，患者在妊娠的过程当中也会出现异位妊娠的情况，同时不孕不育的几率也会大大增加。所以在临床治疗的过程当中，要将盆腔炎治疗的治疗效果进行提高，但是在治疗的过程当中，可以进行治疗的药物较少，并且对于不同药物治疗的安全性也不同，因此要进行深入的试验研究。本次研究选取2020年2月-2020年9月在我院就诊并且接受治疗的100例盆腔炎患者，将其采取不同的方式进行治疗，采用盐酸左氧氟沙星获得了非常好的治疗效果，实验结果如下：

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2020年2月-2020年9月在我院就诊并且接受治疗的100例盆腔炎患者，将其进行随机平均分组方式，分为对照组50例患者，研究组50例患者。对照组患者年龄为24-59岁，平均年龄为 (32.21 ± 6.22) 岁，病程为0.6-4年，平均病程为 (3.32 ± 1.25) 年；研究组患者年龄为23-58岁，平均年龄为 (33.45 ± 6.28) 岁，病程为0.5-4年，平均病程为 (3.26 ± 1.27) 年。对比两组患者的年龄、病程等($P > 0.05$)。

1.2 方法

对照组：采取氧氟沙星（生产企业：浙江得恩德制药有限公司、国药准字H33021415）治疗。将0.4g药物与100ml生理盐水进行混合，采用静脉滴注的方式，一天两次。

研究组：采取盐酸左氧氟沙星（生产企业：海南普利制药股份有限公司、国药准字H20057731）治疗，将0.2g药物与100ml生理盐水进行混合，采用静脉滴注的方式，一天两次。

两组患者治疗时间为一周。

1.3 观察指标

将患者的治疗效果分为三种：显效、有效、无效。显效：患者在进行治疗的过程当中临床症状均消失，检验结果已经达标；有效：患者在临床症状方面均得到了改善，并且检验结果部分已经达标；无效：患者临床症状没有得到改善，并且检验结果未达标。

观察患者不良反应情况。

1.4 统计学分析

本组研究采用SPSS 24.0统计学软件进行数据的分析和处

理，计数资料采用 $[n(\%)]$ 表示，采用 χ^2 检验，计量资料采用均数 $\pm$ 标准差($\bar{x} \pm s$)表示，采用t检验， $P < 0.05$ 为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者治疗效果对比情况

对比两组患者的治疗效果，研究组治疗总有效患者的人数为59例，占比98.33%；对照组治疗总有效患者的人数为32例，占比53.33%。研究组患者治疗总有效率高于对照组患者($P < 0.05$)。

2.2 对比两组患者不良反应发生情况

对比患者在治疗过程中出现不良反应的情况，研究组出现不良反应的患者为3例，占比5.00%；对照组出现不良反应的患者为12例，占比20.00%。研究组患者出现不良反应情况人数以及占比均少于对照组($P < 0.05$)。

3 讨论

在妇科疾病当中，盆腔炎是一种较为常见的疾病，并且与患者自身的个人卫生、性生活混乱、产后感染等有关。根据调查研究显示，患者在性活跃期、月经期患病的风险相对较大，细菌易进入女性的生殖道内，造成内部出现感染以及炎症的情况，从而对患者的身体健康以及身心造成了不良的影响，对于生活质量下降的情况。在治疗盆腔炎疾病当中具有病情反复的特点，所以，在临床治疗当中，有效的治疗盆腔炎在于消除患者体内的炎症，从而达到治疗的目的。

在本次试验研究过程当中，对比两组患者的治疗效果，研究组患者治疗总有效率高于对照组患者($P < 0.05$)。对比患者在治疗过程中出现不良反应的情况，研究组患者出现不良反应情况人数以及占比均少于对照组($P < 0.05$)。

综上所述，在治疗治疗盆腔炎患者中，采用盐酸左氧氟沙星治疗，可以有效的提高患者的治疗效果，以及减少患者的不良反应发生率情况。

参考文献：

- [1] 肖欣幸, 江少坤, 蔡中琼, 杨丽娟, 王立. 盐酸左氧氟沙星注射液用于治疗妇科疾病的临床观察[J]. 吉林医学, 2018, 36(11):2197-2198.
- [2] 李艳梅, 欧洁贤, 刘海燕, 刘裕敏. 盐酸左氧氟沙星在盆腔炎治疗中的临床疗效及安全性评价[J]. 数理医药学杂志, 2018, 31(9):1362-1363.
- [3] 周庆燕, 魏燕红, 曾凤娟. 盐酸左氧氟沙星在盆腔炎治疗中的临床效果及安全性评估[J]. 中国急救医学, 2018, 38(A01):256.