

妇产科护理操作中的患者隐私保护管理

◆黄晓玉 杨永绵

(石家庄市第四医院)

摘要: 目标: 探究并分析如何在妇产科的护理操作中保护患者的隐私。
方法: 选取近一年我院妇产科收治的患者, 病对其病例开展回顾性分析, 通过问卷调查的方式对患者开展调查, 分析患者认知隐私的程度与隐私被泄露的途径, 与此同时, 通过针对性的方式对患者的隐私进行保护以及管理。结果: 在参与本次研究的患者中, 一半患者认为身体的私密部位属于隐私, 五分之一患者认为病自身的病情应该被当做隐私, 其余患者认为则自己的性生活史以及婚育史等情况应该被当做隐私。此外, 77%的患者认为护理人员的操作不当导致隐私的泄露, 23%的患者认为隐私是通过与护理人员沟通的过程中泄露的, 且患者认知隐私的程度与隐私被泄露的途径的差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。结论: 妇产科患者具有一定的隐私需求, 在开展护理工作的过程中, 应该大力加强护理人员与患者对隐私的意识, 强化医院的病理管理, 转变护理方式, 在使患者隐私得到保护的同时, 使护理质量得到提升。
关键词: 妇产科; 隐私保护; 护理操作

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取近一年我院妇产科收治的患者, 并对其病例开展回顾性分析, 患者的年龄分布在 23~54 岁之间, 其中, 一部分患者为卵巢肿瘤、一部分患者为子宫肌瘤、其余剩余患者为宫外孕。

1.2 方法

通过问卷调查的方式对这患者开展调查, 分析患者认知隐私的程度与隐私被泄露的途径, 与此同时, 通过针对性的方式对患者的隐私进行保护以及管理。

1.3 统计学方法

采用 SPSS21.0 软件对数据进行分析, 计量资料采用均数 $\pm$ 标准差表示, $P < 0.05$, 即差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 患者认知隐私的程度分析

在参与本次研究患者中, 一半患者认为身体的私密部位属于隐私五分之一患者认为病情属于隐私, 其余患者认为性生活史和

婚育史等属于隐私。

2.2 隐私被泄露的途径分析

77%的患者认为护理人员的操作不当导致隐私的泄露, 23%的患者认为自身与护理人员沟通时导致的隐私泄露。

3 讨论

3.1 患者对于隐私的理解

首先, 大部分患者认为下阴部和乳房属于身体上的隐私部位, 且患者并不愿意在护理人员以及其他人员面前将身体的隐私部位暴露出来。其次, 也有大量患者认为则自己的性生活史以及婚育史等情况应该被当做隐私, 如自己的隐私遭到暴露, 将会使自身的家庭、名声以及事业等受到严重的影响。患者并不想将此告知自己的朋友以及同事。当护理人员对此进行询问时, 许多患者都羞于回答, 且认为其他人侵害了自身的隐私。

3.2 保护患者自身隐私的相关对策

3.2.1 大力加强护理人员与患者对隐私的意识

3.1 患者对于隐私的理解

首先, 大部分患者认为下阴部和乳房属于身体上的隐私部位, 且患者并不愿意在护理人员以及其他人员面前将身体的隐私部位暴露出来。其次, 也有大量患者认为则自己的性生活史以及婚育史等情况应该被当做隐私, 如自己的隐私遭到暴露, 将会使自身的家庭、名声以及事业等受到严重的影响。患者并不想将此告知自己的朋友以及同事。当护理人员对此进行询问时, 许多患者都羞于回答, 且认为其他人侵害了自身的隐私。

3.2 保护患者自身隐私的相关对策

大力加强护理人员与患者对隐私的意识, 强化医院的病理管理, 转变护理方式, 在使患者隐私得到保护的同时, 使护理质量得到提升。

参考文献:

- [1] 赵莹. 妇产科护理过程中患者隐私保护措施探析[J]. 中国卫生产业, 2017.
- [2] 郭继红. 妇产科护理操作中患者隐私保护问题探讨[J]. 中医药管理杂志, 2016.

