

胸腹部类引流管灵活采用自制固定袋的效果

谢剑红

赣州市人民医院 341000

【摘要】目的：探讨在需要胸腹部类引流管患者中应用自制固定袋的影响。方法：确定研究时间，2021年5月至2022年5月时段，入我院恶性胸腹水患者中抽取60例，以上的患者接受双盲法均分，各30例。对比组（常规固定），分析组（自制固定袋），对比两组患者总舒适度进行分析。结果：分析组总舒适度优于对比组（ $p < 0.05$ ）。结论：目前在恶性胸腹水疾病治疗中，安全有效的方案很多，其中引流管灵活采用自制固定袋十分必要，从长期看效果更好，更有利于患者舒适度提升，安全性更高，应在该领域广泛应用。

【关键词】胸腹部；引流管；固定袋

当前，在临床上的晚期恶性肿瘤患者中，其由于长期治疗以及病情发展，则会出现体腔中液体大量增加的异常情况，这种并发症情况称为恶性胸腹水，在该类患者中发生率较高^[1]。在临床研究中，如果患者腹腔内的积液持续上升，到达500毫升时，其身体会出现明显反应，不仅会有胸闷、气短等反应，对于患者身心健康以及生存质量也会有所下降^[2]。临床上，对于该情况的干预方案，旨在帮助患者进行引流，该操作对于患者的身体也会造成一定影响，导致引流管寿命出现问题，同时伴随各类原因导致其固定出现问题，引发非计划性拔管等问题，引发严重后果。因此，本文旨在探索对于该类患者，采取自制固定袋的具体效用，详细内容如下：

1. 资料与方法

1.1 一般资料

选取我院自2021年5月至2022年5月时段恶性胸腹水患者60例，借助双盲法均分，30/例。对比组：女性14例，男性16例，实际年龄区间在42到78岁之间，均值为（ 60.51 ± 1.56 ）岁，其中胸腔积液引流术11例，腹腔积液引流术19例；分析组：女性15例，男性15例，实际年龄区间在40到80岁之间，均值为（ 60.12 ± 2.08 ）岁，其中胸腔积液引流术15例，腹腔积液引流术15例，对一般资料进行整体分析对比，统计学对比结果无差异（ $p > 0.05$ ）。

1.2 方法

对比组，采取常规的固定方式，为患者清洁皮肤，保证其干燥状态，为其进行敷贴，固定引流管。

分析组，采取自制固定袋，操作如下：

准备固定袋制作工具，其中包括腰带、背带、固定袋等，固定袋用于引流，背带将其固定在肩膀上，腰带的两端要放有固定件，将其固定在腰部位置，并且设置固定扣，将固定带固定在腰带上。背带对于引流袋进行承重，腰带对其重力进行分担，在此制作下，患者的双手活动范围不受到限制，对于肩带可以进行调节，患者不需要用手提着引流袋，规避逆流等风险。

1.3 判定指标

分析对比两组患者总舒适度。

1.4 统计学分析

借助统计学软件SPSS25.0对2组患者的相关研究指标进行有效检验， $[n(\%)]$ 与 $(\bar{x} \pm s)$ 分别代表对比计量与计数资料；组间差异较为明显（ $p < 0.05$ ）。

2. 结果

2.1 对比两组患者总舒适度

分析组患者总舒适度高于对比组，结果差异明显（ $p < 0.05$ ），见表1。

表1 对比两组患者总舒适度 $[n(\%)]$

组别	舒适	一般舒适	不舒适	总舒适度
分析组（n=30）	28（93.33）	2（6.66）	0（0.00）	30（100.00）
对比组（n=30）	6（20.00）	9（30.00）	15（50.00）	15（50.00）
X ² 值				20.000
p值				<0.001

3. 讨论

当前,临床上该类患者应用积液引流术时,存在较多影响因素,其中包括导管粗细、皮肤是否缝合、导管固定不牢固等,这些都会导致各类意外事件的发生,不仅不利于患者后续治疗,还会引发感染等严重后果。在该类患者治疗中,需要进行多次反复引流治疗,如果导管出现脱落等意外情况,则会为患者带来痛苦。为了最大程度规避该风险,需要对其进行相关干预^[3]。

在自制固定袋中,对其材质选择柔软、透气的棉质材料,降低对于患者皮肤的刺激性,在固定中对其进行加压,患者疼痛感有所降低。在导管固定上,也要使患者增加活动度;在护理中,为其做到清洁,避免感染^[4]。

在本次研究中,相比对照组,分析组患者舒适度更高。

综上所述,对于此类患者,引流治疗中应用自制固定袋效用明显,其舒适度较高,不良风险规避良好。

参考文献:

- [1]刘艳. 一种自制床旁引流袋固定装置[J]. 当代护士(下旬刊),2021,28(2): 185.
- [2]黄琦,曹烽,周金哲,等. 应用吻合环复合装置对直肠癌手术行保护性回肠造口的临床研究[J]. 中华胃肠外科杂志,2017,20(12): 1375-1380.
- [3]冯清亮,柯以铨,刘艳君,等. 脑科引流固定器的设计与应用[J]. 转化医学电子杂志,2018,5(8): 5-7.
- [4]徐月华,封艳,沈晓菲. 自制神经外科标尺引流夹在神经外科中应用[J]. 中国保健营养,2019,29(28): 110-111.