

腹腔镜下子宫全切术患者实施手术室护理的价值分析

刘 杨

定州市人民医院 河北省保定市 071000

【摘要】目的：观察分析手术室护理应用于腹腔镜下子宫全切术患者的效果。方法：50例患者（2022年8月~2023年7月收治）均接受手术室护理，统计并发症发生情况及患者对护理工作的满意。结果：50例患者并发症总发生率仅为2.00%。

50例患者对手术室护理的总满意率达到98.00%。结论：手术室护理应用于腹腔镜下子宫全切术患者时，能够将并发症发生率控制在极低水平，从而收获患者的广泛认可。

【关键词】腹腔镜下子宫全切术；手术室护理；并发症；满意度

引言

腹腔镜下子宫全切术（Laparoscopic Hysterectomy, LH）作为一种先进的微创手术方式，近年来在妇科手术中的应用较为广泛^[1]。与传统开腹手术相比，腹腔镜手术具有创伤小、恢复快、并发症少等优点，深受患者欢迎。随着医疗技术的进步和手术器械的完善，LH的安全性和可行性不断提高，成为治疗多种妇科疾病的有效手段。然而，手术的安全性与效果不仅取决于手术技术本身，手术室内的护理工作同样起着至关重要的作用。手术室护理工作是确保手术顺利进行的重要保障，尤其在腹腔镜手术中，护理人员的专业性对患者术中术后的安全和恢复有着直接影响^[2]。从术前准备、术中协助到术后恢复，每一个环节的护理都需要精细化管理和高标准执行。对LH患者实施优质的手术室护理，不仅能够减少手术并发症，缩短住院时间，还能够提高患者的满意度，促进患者的身心健康。本研究旨在探讨手术室护理应用于LH手术患者的价值，现围绕研究过程及结果作如下报告。

1. 资料与方法

1.1 一般资料综述

从本院2022年8月~2023年7月收治的妇科疾病患者中选取50例，以此作为主要分析对象。

纳入标准：（1）确诊为子宫肌瘤、子宫内膜异位症、子宫内膜癌等疾病，需要在本院接受腹腔镜下子宫全切术的患者；（2）知悉本研究并

同意将临床资料用于本研究的患者。

排除标准：（1）存在严重粘连或其他解剖异常，不适合接受腹腔镜手术的患者；（2）对腹腔镜手术缺乏理解，拒绝接受此种手术治疗的患者；（3）合并其他严重疾病的患者。

50例患者的基础资料如下：年龄区间26~54岁，平均 (41.16 ± 2.51) 岁；病程区间3~6个月，平均 (4.13 ± 0.42) 个月；所患疾病类型分布：子宫肌瘤23例、子宫内膜异位症20例、子宫内膜癌3例、其他4例。

1.2 研究方法简析

50例患者在腹腔镜手术期间，均接受手术室护理，流程如下：

（1）患者被送入手术室后，护士首先与患者核对个人信息、手术部位和术前准备情况，确认无误后，协助患者换上手术服，并进行必要的体位调整。护士还需要确保手术器械、药品和监护设备齐全并处于工作状态。

（2）在局部麻醉后，护士根据患者的静脉情况选择合适的穿刺部位，在消毒后建立静脉通道。需要注意的是，护士需遵循无菌操作规范，确保术中输液顺利和患者安全。

（3）护士协助麻醉医生对患者进行全面的监测，包括心电监测、血压、呼吸等生命体征的监护，并在术中持续记录相关数据。在麻醉诱导过程中，护士需要密切观察患者的反应，及时采取措施应对可能出现的不良反应。

(4) 护士负责为手术准备所需的腹腔镜器械、吸引器、止血钳等设备,并确保其在手术过程中处于最佳工作状态。护士需要熟悉各种器械的用途和操作方法,以便在医生需要时迅速提供支持。

(5) 在手术进行过程中,护士需要密切观察患者的生命体征和手术场景,及时反馈给医生并协助处理突发情况。此外,护士还需要根据医生的指示递送器械、调节手术台位,保持手术场地整洁和无菌状态。

(6) 手术结束后,护士协助医生完成伤口缝合和敷料换药等术后护理工作,并监测患者的生命体征恢复情况。护士还需要指导患者术后的饮食和活动注意事项,以及提供必要的疼痛缓解和护理指导。

1.3 观察指标界定

(1) 统计 50 例患者的并发症发生情况,包括切口感染、呼吸抑制、呕吐。

(2) 按照下列标准,评估 50 例患者对护理工作的满意度。

①非常满意。患者认为手术过程非常顺利、期间得到无微不至的关照。

②基本满意。患者认为手术过程较为顺利,护理工作基本达到自身预期,但一些细节方面有待加强。

③不满意。患者认为自身出现并发症及其他不良反应是因为手术期间未得到良好照顾而导致,故对手术室护理不满。

总满意率计算: (非常满意+基本满意) / 50 × 100%。

1.4 统计学分析

以 SPSS25.0 统计学软件分析本研究的有关数据,以“t”检验计量资料,以“ $\bar{x} \pm s$ ”表示;以“ χ^2 ”检验计数资料,以“n (%)”表示。

2. 结果

2.1 患者并发症发生情况

50 例患者中,只有 1 例患者出现切口感染,无其他并发症发生,总发生率仅为 2.00%。

2.2 患者满意度情况

50 例患者中,对手术室护理持有非常满意、基本满意、不满意例数的患者数量分别为 20 例、29 例、1 例,总满意率达到 98.00%。

3. 综合讨论

本研究结果显示,手术室护理在腹腔镜下子宫全切除术中发挥了重要作用,将并发症发生率控制在仅有 2.00% 的低水平,同时取得了 98.00% 的患者满意率。该结果证明了手术室护理对手术过程安全性的保障作用以及提高患者体验方面的重要作用。通过精心设计的护理方案、把控手术期间的护理细节,能够有效降低并发症的发生风险,提升手术的成功率和患者的满意度。这一研究结果对于临床实践的意义是:其一,强调了手术室护理在手术过程中的不可或缺性,需要医疗机构和护理团队高度重视。其二,低并发症发生率和高满意度反映了患者对护理质量的肯定,对于医院的声誉和品牌建设具有积极影响。

综上所述,手术室护理在腹腔镜下子宫全切除术中的成功应用,不仅体现了现代医疗水平的提升和护理理念的创新,更为患者的健康和医疗服务的可持续发展提供了一定的参考。

参考文献:

[1] 马素沐. 腹腔镜下子宫全切除术患者实施手术室护理的价值[J]. 婚育与健康, 2024, 30(01): 124-126.

[2] 卢宇琴. 腹腔镜下子宫全切除术的患者实施优质手术室护理的效果分析[J]. 实用妇科内分泌电子杂志, 2021, 8(29): 120-122.