

# 预防性护理在手术室护理中的作用

杨飞

江阴市中医院 江苏 江阴 214432

**【摘要】**目的：分析预防性护理在手术室护理中的作用。方法：选取手术室就诊的患者50例，随机均分为对照组和观察组，对照组进行常规护理，观察组进行预防性护理，对比护理质量。结果：观察组护理质量优于对照组（ $P<0.05$ ）。结论：在手术室患者护理期间，采用预见性护理可提高患者手术过程中的安全性，分析患者在临床护理期间可能出现的风险因素，了解两组患者手术干预期间的并发症。对患者进行针对性的临床护理，符合我院对该领域护理工作的认知以及需求，目前已经在临床取得阶段性的进展，建议在后续研究过程中分析患者可能出现的风险事件，并给予针对性的应对措施，建议在临床进行针对性的研究。

**【关键词】**：预防性护理；手术室护理；护理质量

## The role of preventive nursing in operating room nursing

Fei Yang

Jiangyin Traditional Chinese Medicine Hospital Jiangsu Jiangyin 214432

**Abstract:** Objective: To analyze the role of preventive nursing in operating room nursing. Methods: Fifty patients were randomly divided into a control group and an observation group. The control group received routine nursing care, while the observation group received preventive nursing care, and the quality of nursing care was compared. Results: The nursing quality of the observation group was better than that of the control group ( $P<0.05$ ). Conclusion: During the nursing period of patients in the operating room, predictive nursing can improve the safety of patients during surgery, analyze the risk factors that may occur during clinical nursing, and understand the complications during surgical intervention in both groups of patients. Targeted clinical care for patients is in line with our hospital's recognition and needs for nursing work in this field. Currently, phased progress has been made in clinical practice. It is recommended to analyze possible risk events that may occur in patients during subsequent research, and provide targeted response measures. It is recommended to conduct targeted clinical research.

**Keywords:** Preventive care; Operating room nursing; Quality of care

手术室为临床重点建设科室，一般承担对患者进行手术的重要责任。然而，在对患者进行手术治疗期间，还应对患者进行针对性的临床护理措施，注重对患者手术室细节的护理政策，并对患者的临床护理安全进行保障<sup>[1]</sup>。预防性护理是指在对患者进行手术之前，选择风险等级调查表，了解患者的手术过程中可能出现的风险事件，并且结合医院的实际情况以及传统病例进行有针对性的干预措施，符合医院在该领域的护理体系建设发展。为了探究两种护理模式的护理优势以及护理劣势，我院选取在就诊的患者对两种护理数据进行有针对性的临床分析，不仅可以确定患者在护理期间的护理质量，还可以为我院在该领域的发展做出自己的贡献<sup>[2]</sup>。

### 1 资料与方法

#### 1.1 一般资料

选取2020年2月~2021年2月手术室就诊的患者50例，随机均分为对照组和观察组，每组25名。观察组男/女：12/13，均龄为（49.51±2.66）岁。对照组男/女：11/14，均龄为（47.21±3.54）岁（ $P>0.05$ ）。

#### 1.2 方法

对照组进行常规护理：（1）监测患者手术过程中的生命体征：在患者进行手术期间，临床应帮助患者监测手术过程中的生命体征，并且告知患者手术过程中的注意事项，保证患者临床手术安全。（2）环境护理：在手术室对患者进行环境护理，采用紫外线杀菌法，对空气中的细

菌含量进行严格控制，并且保证空气的温度以及湿度，避免患者出现着凉。（3）药物护理：患者在手术工作结束后，临床要对患者进行药物护理措施，保证患者切口的安全，避免患者出现切口感染。（4）手术后康复护理：在患者手术工作结束后，临床应对患者进行康复护理措施，通过保证患者临床手术康复价值，提高患者手术过程中的康复有效性，缩短患者临床愈合周期。

观察组进行预防性护理：（1）建立预防性护理小组：在护理小组建立期间，应选择具有丰富经验的护理人员做副组长负责成员，并且选取具有丰富护理经验的护士长作为小组内的护理管理人员。通过了解在护理过程中可能出现的风险事件，并对患者进行有针对性的临床干预措施，结合医院实际情况，确定临床护理计划，总结以往手术过程中的病例，寻求共同点。了解患者手术过程中的突发事件，并对患者的机体突发事件进行有针对性的预防措施，帮助患者建立临床护理资料。在护理资料中，不仅要记录患者的性别年龄，还应记录患者的手术情况以及并发症等具体细节，结合患者手术资料不同，帮助患者选择不同程度的临床护理计划<sup>[3]</sup>。（2）手术前预防性护理：在患者手术工作结束前，临床应观察患者是否出现过敏史，如果出现过敏史，应在手术过程中做到及时注意，避免患者出现过敏。在手术前帮助患者核对手术名称以及临床麻醉方式，在医生的配合下，准备手术过程中的必需品，保证患者手术工作的顺利进行。采用风险等级调查表，了解

患者的手术过程中可能出现的风险事件，并且患者及其家属进行简单解释。如果患者此时内心心理状态较差，在患者手术工作结束后，可能会出现应激性心理，此时应对患者进行心理排解措施，告知患者手术在临床的重要意义，以及我院对于该手术的专业性，从而提高患者对疾病战胜的信心<sup>[4]</sup>。（3）手术中预防性护理：在患者手术中应对患者的临床生命体征进行监测，包括血压以及血氧饱和度等生命提升。在进行监测的过程中，应严格注意患者手术中的注意事项。如果患者对手术工作比较敏感，此时可以采用语言转移患者的注意力。不仅可以保证患者临床手术安全，还可以提升患者的心理承受能力。在麻醉前应该对手术部位以及患者信息，保证手术信息的正确性，在手术过程中严格清点手术用品以及手术药物。在手术期间及时将手术期间传递到医生手中，如果出现异常情况，应及时上报。如果患者手术较为复杂，在进行临床干预期间，与麻醉时进行配合，完善患者的输血以及输液系统。在手术工作结束前，应准确清理临床手术用品，避免手术用品遗留在患者机体内，导致患者基体出现不良事件。（4）手术后预见性护理：由于在患者手中后期间可能出现多种不良事件，此时应对患者进行预防性的护理措施，了解以往病例，总结在患者康复期间可能出现的不良事件，并对患者进行有针对性的临床预防。在临床应预防患者机体出现

压疮，在患者术后康复期间，应定期帮助患者翻身，避免皮肤长时间处于在严重压力下，可保证患者在该领域的临床手术安全性。在制定临床手术计划期间，应主要分析患者手术后的切口情况，避免患者出现感染，并按时帮助患者更换辅料。如果患者在手术工作结束后，需要进行导管等，应注意导管，避免出现导管曲折。如果出现引流，就及时观察引流液的颜色以及数量，可以提高患者的手术过程中的安全性。如果患者在手术后需要进行鼻饲喂养，选用饮食干预措施，及时控制患者各微量元素的摄入量，导致患者机体内的营养平衡，避免患者出现营养不耐受等。患者下床时应对患者进行机体运动干预，避免患者出现跌倒等不良事件。从多种维度出发，提高或者在临床治疗过程中的安全性或程患者临床护理价值，符合医院的本领域的临床护理技术发展<sup>[5]</sup>。

### 1.3观察指标

对比护理质量。

### 1.4统计学方法

统计学结果由SPSS26.0统计学软件统计完成，若组间数据对比结果差异显著P<0.05，则具有统计学意义。

## 2 结果

观察组护理质量评分高于对照组（P<0.05）。

表 1 对比护理质量评分 [ (x±s) / 分 ]

	评价时间	对照组 (n=25)	观察组 (n=25)	t	P
前瞻性病情分析	干预前	61.47 ± 8.86	61.44 ± 8.58	0.017	0.986
	干预后	69.63 ± 7.68	78.89 ± 8.78	-5.613	<0.001
医嘱执行	干预前	62.68 ± 6.89	62.47 ± 7.04	0.151	0.88
	干预后	72.36 ± 7.07	80.77 ± 7.56	-5.745	<0.001
护理急救	干预前	74.75 ± 9.37	74.73 ± 9.14	0.011	0.991
	干预后	79.45 ± 9.47	86.48 ± 7.36	-4.145	<0.001
医患配合满意度	干预前	61.92 ± 10.95	62.14 ± 11.24	-0.099	0.921
	干预后	67.43 ± 11.47	76.27 ± 11.75	-3.807	<0.001
护理态度	干预前	66.47 ± 8.59	66.15 ± 8.96	0.182	0.856
	干预后	74.75 ± 8.14	82.78 ± 9.14	-4.639	<0.001
心理疏导	干预前	63.47 ± 10.01	63.08 ± 10.17	0.193	0.847
	干预后	70.40 ± 9.74	79.78 ± 10.13	-4.72	<0.001
管理措施	干预前	69.18 ± 4.44	70.01 ± 4.15	-0.966	0.336
	干预后	79.41 ± 5.78	86.54 ± 5.56	-6.286	<0.001
操作水平	干预前	72.39 ± 8.75	71.93 ± 8.41	0.268	0.789
	干预后	80.33 ± 8.67	88.46 ± 8.04	-4.862	<0.001

## 3 讨论

手术室是临床用于抢救病人及进行手术的重要场所，在临床治疗过程中，工作强度较大，风险等级较高，并且属于风险高发科室。因此，在对患者进行手术工作中，如果不对患者进行预防性的护理措施，会导致患者机体出现手术不良事件，对临床护理服务也具有较高的要求。因此，在对患者进行临床护理期间，应剖析传统护理模式，对患者进行预防性护理措施。采用以往的护理档案，了解在手术过程中可能出现的风险事件，并针对风险事件进行有针对性的干预措施。

在进行临床护理期间，护理人员往往会承受到较大的心理压力，在手术过程中，如果出现失误，会导致患者生命受到威胁。因此在进行预防性护理期间，应建立周密的临床护理计划，保证患者手术过程中的安全性，符合患者及家属的该领域的临床护理需求。预防性护理是指在对患者进行护理期间，了解患者在护理过程中得出现的风险事件，并针对各项风险事件及针对性的应对措施。不仅可以保证患者临床护理质量，还可以相比传统手术室护理更好的以患者为中心，结合患者的个人治疗，对患者展开针对性的两种护理措施。因此，本次研究为了探究两种护理

模式的护理有效性,选取在我院手术室就诊的患者,采用两种护理模式分析两种护理临床数据,创立有针对性的临床护理措施。在术前、术中、术后为患者提供周边的临床护理服务,在保证患者临床护理安全性的前提下,提高患者护理服务质量,符合医院在该领域的临床护理需求。在整体护理过程中,可以在手术室采用预防性护理,提高患者的舒适度,同时使患者注意护理环节的注意事项,提高安全控制等临床护理细节,制定有针对性的护理方法。在满足患者护理需求的前提下,临床护理应重视对患者安全性的评价。与常规护理不同的是,手术室预防性护理既能满足患者对护理工作的具体需求,也应根据患者的一般信息不断完善手术护理的细节,这符合医院临床护理这方面的要求,值得在我床上有针对性地分析。在研究过程中,通过有针对性的措施,分析手术患者对两种护理方式的态度及相关临床数据,提高医院临床护理技术水平。通过建立有针对性的临床护理管理体系,帮助患者在手术前做好手术准备,维护患者正常的身体体征。在手术过程中,不仅要患者的身体进行护理,还要对患者的心理素质进行护理措施,并告知患者医院在这方面的专业护理,鼓励患者配合护理人员的护理工作,可以提高患者的临床护理价值。患者手术后,护理人员应监测患者的身体健康状况,并告知患者的预后和康复注意思想,通过建立完整的临床护理体系,提高患者在该领域的临床护理效果,提高医院在该领域的临床护理价值,在今后的临床护理过程中,应

#### 参考文献:

- [1] 谭婷.手术室术中预防性护理干预对下肢深静脉血栓发生的影响[J].世界最新医学信息文摘,2021,21(56):118-119.
- [2] 刘彦芳,侯志艳.术中获得性压力性损伤风险预测模型的构建及应用效果研究[J].现代临床护理,2022,21(4):1-7.
- [3] 郭旋.PDCA循环联合预防性护理对手术室护理风险事件预防的价值分析[J].婚育与健康,2022,28(21):136-138.
- [4] 王晓宁.PDCA循环联合预防性护理对手术室护理风险事件预防的价值分析[J].中国校医,2022,36(1):61-63,67.
- [5] 郭芳.PDCA管理配合预防性护理干预对手术室护理质量提升的临床价值分析[J].中国医药指南,2022,20(24):35-38.

注意患者的安全,通过改善患者的手术指标,确保患者在该领域的临床护理价值,为我院的发展贡献自己的一份力量。在细致护理过程中,患者应首先分析临床护理过程中可能发生的风险事件,并使用风险等级问卷了解护理过程中可能发生的不良事件。为了满足患者进入家庭护理的需求,在患者饮食和多种领域的基础上采取定性护理措施,不仅有利于临床领域的发展,也能在护理过程中提高患者的临床护理质量。如果患者在护理过程中发生不良事件,应采取应急预案,确保患者在术前、术中、术后接受高质量的临床护理,符合我院在该领域的临床护理需求,可以加强我院在该领域护理技术的发展,建议开展临床研究和推广。在治疗过程中,应总结影响患者不良状态的主要因素,并结合不良事件和不良状态给予患者针对性的临床护理措施,符合医院在该领域的发展方向,从细节上给予患者针对性的临床护理,符合医院在该领域的临床护理需求

综上所述,在手术室患者护理期间,采用预见性护理可提高患者手术过程中的安全性,分析患者在临床护理期间可能出现的风险因素,了解两组患者手术干预期间的并发症。对患者进行针对性的临床护理,符合我院对该领域护理工作的认知以及需求,目前已经在临床取得阶段性的进展,建议在后续研究过程中分析患者可能出现的风险事件,并给予针对性的应对措施,建议在临床进行针对性的研究。