

护理安全管理对血液透析室护理质量的影响研究

闻祝平

(华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院 430014)

摘要:目的 研究护理安全管理对血液透析室护理质量的影响。方法 从2018年11月-2019年11月到本院进行血液透析的患者中任意选择100例作为研究对象,按照单双号分组原则,将其分为两组,每组50例患者。基本资料无差异的情况下,对照组患者接受传统护理干预,观察组患者接受护理安全管理。将两组血液透析患者的护理质量评分、护理满意度以及临床指标进行对比。结果 观察组护理质量评分、出血情况以及导管感染率明显优于对照组;观察组的护理满意度为96%,对照组的护理满意度为70%,两组血液透析患者的护理质量评分、护理满意度以及临床指标存在统计学意义, ($P < 0.05$)。结论 将护理安全管理应用于血液透析室的护理过程中,使护理质量明显提升,降低了风险事故的发生,营造了一个良好的血液透析室治疗环境,具有积极的推广价值。

关键词: 血液透析室; 护理安全管理; 护理质量; 风险发生率

1 资料与方法

1.1 一般资料

从2018年11月-2019年11月到本院进行血液透析的患者中任意选择100例作为研究对象,按照单双号分组原则,将其分为两组,每组50例患者。

对照组:男、女比例为29:21,年龄范围在45-75岁,平均年龄(55.1 ± 3.6)岁,病程为3个月-3年。

观察组:男、女比例为27:23,年龄范围在41-73岁,平均年龄(52.8 ± 3.1)岁,病程为2个月-2年。两组血液透析患者的基本资料纳入软件SPSS20.0系统发现 $P > 0.05$,无差异可对比。

1.2 护理方法

给予对照组50例血液透析患者实施传统护理干预,具体的护理内容如下:(1)体征监护:血液透析的过程中,护理人员需要密切患者的体征变化,其中包括心率、血压、血氧饱和度等,如果出现异常情况,则需要立即通知主治医师进行处理。(2)心理辅导:焦虑、抑郁等负面情绪十分不利于患者的血液透析治疗,护理人员需要对患者实施专业的心理辅导,消除患者的内心压力。

给予观察组50例血液透析患者实施护理安全管理,具体的护理过程如下:(1)组建护理安全管理小组:由护士长作为责任组长,对血液透析过程中可能出现的风险进行评估,制定出针对性的应急方案,提前做好预防措施,减少意外事故的发生。(2)强化护理人员专业能力:血液透析室的护理人员需要具备较高的风险防范意识和高水平护理技能,因此定期需要接受专业培训,培训的内容包括操作技能、专业知识、透析机器的操作方法和养护、并发症的处理

两组血液透析患者护理质量对比

组别	护理质量评分	护理满意度	出血情况	导管感染率
对照组 (n=50)	76.48 ± 2.65	35 (70.0)	7 (14.0)	5 (10.0)
观察组 (n=50)	96.11 ± 2.03	48 (96.0)	2 (4.0)	0 (0.0)
t/X ²	37.1913	1.3127	3.0986	5.3191
P	< 0.05	< 0.05	< 0.05	< 0.05

3 讨论

临床上,血液透析常用于肾病的治疗,在进行血液透析的任何环节都可能出现意外风险事故,导致护理安全的发生,比如说身体损伤、心理损伤、身体功能障碍等。为了消除血液透析室存在的安全隐患,我们将护理安全管理应用于患者血液透析的过程中,能够有效地降低风险事故的发生,降低医疗纠纷的产生。通过本次研究结果发现,护理安全管理能够在很大程度上增强护理人员的责任心,提升护理人员的专业技能,规范了护理人员的操作行为,为患者营造了一个更加安全、舒适的血液透析环境,缓解了我国当前较为紧张的医患关系^[1]。

措施,每次培训的内容护理人员都需要接受考核,只有通过考核才能够上岗。与患者进行交流沟通的过程中,护理人员需要以积极的态度与之对话,注意自己的用词,减少医疗纠纷的产生。(3)专项护理:患者进行透析之前,护理人员需要掌握患者的病情状况,了解患者是否存在艾滋病、乙肝等传染性疾病,如果存在,则需要在专门的区域内进行血液透析并有专人看护,以免出现感染情况的发生^[1]。(4)血液透析室内的护理:血液透析室需要严格限制人员的进出,患者进入前,需要进行全面消毒,穿戴专门的鞋子才能够进入,护理人员则需要穿戴全套无菌装备^[2]。

1.3 观察指标

两组血液透析患者接受不同护理干预后,对护理质量进行评分,满分为100分,分数越高则说明护理质量越优秀。然后利用本院制定的护理满意度评估表对患者进行评估,最终等级分为:特别满意、满意和不满意。对比两组血液透析患者的出血情况和导管感染率。

1.4 统计学方法

利用SPSS20.0的Excel表中,进行对比和检验值计算,若 $P < 0.05$,为比较差异具有统计学意义。

2 结果

观察组护理质量评分、出血情况以及导管感染率明显优于对照组;观察组的护理满意度为96%,对照组的护理满意度为70%,两组血液透析患者的护理质量评分、护理满意度以及临床指标存在统计学意义, ($P < 0.05$)。

综上所述,将护理安全管理应用于血液透析室的护理过程中,使护理质量明显提升,降低了风险事故的发生,营造了一个良好的血液透析室治疗环境,具有积极的推广价值。

参考文献:

- [1] 邴连琨,王虹,宋丽娜,施爱茹.护理安全管理对血液透析室护理质量的影响[J].中国当代医药,2020,27(11):190-192+196.
- [2] 罗仕妙,聂金梅,张芳苹.护理安全管理对血液透析室护理质量的影响分析[J].中医临床研究,2019,11(30):141-142.
- [3] 白淑萍.护理安全管理对血液透析室护理质量的影响观察[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(83):327-328.