

加强护理管理在ICU侵袭性真菌性医院感染防控中的作用

田娟 黄娟^{通讯作者}

(荆门市第一人民医院院感科 湖北 荆门 448000)

摘要:目的 探讨加强护理管理在ICU侵袭性真菌性医院感染防控中的作用。方法 选取2019年11月-2020年11月还未实施加强管理时我院ICU收治的31例患者作为对照组,选取2020年12月-2022年12月实施加强管理时我院ICU收治的31例患者作为研究组,对两组患者感染情况及对护理满意度进行比较。结果 研究组患者感染率高于对照组($P < 0.05$);研究组患者对护理满意度高于对照组($P < 0.05$)。结论 对ICU患者实施加强护理管理,可以有效预防侵袭性真菌感染,降低院感发生率,缓解护患关系,患者对护理也更加满意,因此值得推广应用。

关键词:加强护理管理;ICU;真菌性;医院感染防控

ICU是医院的重症监护室,患者均为危急重症疾病,需要进行特殊治疗及护理。该科室中的高危因素要远远高于其他科室,此外,科室内患者的病情具有进展迅速、情况危急的特点,同时也存在极高的感染率,因此,该科室的护理工作要求也更为严谨,护理人员必须具备较强的责任心^[1]。然而在进行护理期间,由于患者自身因素、不规范的护理和医疗设备操作及其他外界危险因素,都会导致科室内患者发生侵袭性真菌性医院感染^[2]。所以,对于ICU科室内患者而言,加强护理管理是十分重要的。我院选取实施加强护理管理前后的ICU患者作为研究对象进行对比,现将详细内容报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取2019年11月-2020年11月还未实施加强管理时我院ICU收治的31例患者作为对照组,其中男18例,女13例,年龄31-86岁,平均(52.4±3.7)岁,选取2020年12月-2022年12月实施加强管理时我院ICU收治的31例患者作为研究组,其中男21例,女10例,年龄33-84岁,平均(52.8±3.4)岁,患者及家属知情且同意本次研究,两组患者一般资料无明显差异($P > 0.05$),同时经过医院伦理委员会批准。

1.2 方法

对照组患者未实施加强护理管理。

研究组患者实施加强护理进行管理,方法如下:①成立加强护理管理小组:包括:2名护士长、6名专业护理人员,通过相关培训,考核完成后方可进行护理工作,护理人员的工龄均在5年以上,考核包括护理人员心理素质、专业能力、管理水平及思想品质。护士长需要做好配合和监督的工作,确保每项工作在护理期间都得到落实。②强化护理管理培训:加强对护理人员的相关管理知识的培训,可以让医院具备更多更优秀的管理人才。护士的工作较为复杂多样,因此培训期间应得到重视。同时护理人员还需要具备高尚的品德及思想,对自己每日的工作有确定的目标,让护理人员正确了解自己的本职工作并热爱本职工作,在工作期间以患者为中心,尽量满足患者的生理及心理需求,充分体现人性化服务,给患者关心和尊重,学会换位思考,主动与患者进行沟通交流,建立良好的护患关系。每位护士应有属于自己的技术档案,便于进行监测和落实工作。为患者提供全面性的服务,护士长应把控制好科室的运行情况,对护理期间的服务态度应严格要求,为患者提供优质、周到的护理服务。在采集标本是应规范操作,避免标本受到污染等。特别是痰液标本及血尿标本,必须在无菌环境下进行采集,采集完成后及时进行检验。③强化工作细节:在对患者进行护理的过程中,尤其是工作细节需特别注意,细节的处理十分正确合理决定着工作能否更好的完成。④强化护理人员手卫生管理:护理人员手卫生与院感的发生存在着密切的关联,所以,这就要求护理人员每天在工作期间必须严格按照手部卫生管理要求进行操作,避免真菌通过手部传播^[3]。

1.3 观察指标

对两组患者感染情况进行比较。

对护理满意度进行比较。包括:满意、基本满意和不满意。

1.4 统计学处理

统计学版本:SPSS 23.0, χ^2 检验%资料; $P < 0.05$ 有差异。

2 结果

2.1 感染情况

研究组患者感染率高于对照组($P < 0.05$),见表1。

表1 感染情况对比(例,%)

组别	例数	下呼吸道感染	尿道感染	发生率
对照组	31	5	3	25.8%
研究组	31	2	1	9.7%
χ^2	/	4.294	4.391	4.935
P	/	< 0.05	< 0.05	< 0.05

2.2 满意度对比

研究组患者对护理满意度高于对照组($P < 0.05$),见表2。

表2 护理满意度对比(例,%)

组别	例数	满意	基本满意	不满意	护理满意度
对照组	31	9 (29.0)	14 (45.2)	8 (25.8)	74.2%
研究组	31	13 (41.9)	16 (51.6)	2 (6.5)	93.5%
χ^2	/				4.935
P	/				< 0.05

3 讨论

ICU科室的患者局均有病情危急重的特点,且病情进展较为迅速,严重威胁着患者的生命安全,因此,护理工作在该科室显得尤为重要^[4]。然而,护理人员在护理时,由于操作不规范等原因,而患者自身各机能的功能水平较差,导致侵袭性真菌感染的发生率明显高于其他科室,而院感的发生不仅增加了护理人员的工作难度及工作量,也给患者的生命安全造成严重威胁。因此,对于ICU科室而言,护理管理工作必须要严格加强和落实,阻断一切有可能导致院感时间发生的危险因素,通过室内环境、患者随身衣物用品、医疗设备及护理人员对工作态度等方面进行加强管理,严格要求护理质量,减少院感发生率,进一步加强ICU科室的院感防控效果,从而确保患者的生命安全。此次研究结果显示:研究组患者感染率高于对照组($P < 0.05$);研究组患者对护理满意度高于对照组($P < 0.05$)。

综上所述,对ICU患者实施加强护理管理,可以有效预防侵袭性真菌感染,降低院感发生率,缓解护患关系,患者对护理也更加满意,因此值得推广应用。

参考文献:

- [1] 黄凡,王密芳,朱依筠,等. 强化细节管理在减少ICU清醒患者环境压力源中的应用效果[J]. 中国中西医结合急救杂志, 2021, 28(3):4.
- [2] 王旭霞,张海娇,田弢,等. 基于5M1E分析法的护理管理模式对ICU患者多重耐药菌院内感染的影响[J]. 中华现代护理杂志, 2021, 27(29):4.
- [3] 吕聪聪. 分级护理管理对重症颅脑损伤患者院内感染率及住ICU时间的影响[J]. 山东医学高等专科学校学报, 2020, 42(1):2.
- [4] 邓红云,黄文柳. 护理风险质量管理在降低ICU患者医院感染率中作用的效果分析[J]. 健康女性, 2021, 13(2):1.