

临床护理路径对慢性化脓性中耳炎患者护理质量及满意度的影响

谢婷婷

(湖北医药学院附属襄阳市第一人民医院 湖北省 襄阳市 441000)

摘要:目的:分析和研究临床护理路径对慢性化脓性中耳炎患者护理质量及满意度的影响。方法:研究起止时间为2018年11月-2019年8月,同时选择我院收治的慢性化脓性中耳炎患者84例为研究对象,后采取随机分组法将所有患者分为A组(n=42例)和B组(n=42例)。其中对B组实施常规护理,而A组则实施临床护理路径的护理措施,之后比较两组患者身体健康状况。结果:在对护理人员工作满意度的比较方面,相较于B组护理后的满意度76.19%,A组护理后的满意度97.62%显著更高,同时在护理质量的比较方面A组也显著优于B组,表明两组患者之间的差异具有可比性($P < 0.05$)。结论:临床护理路径在慢性化脓性中耳炎患者中的运用,有利于患者护理质量的持续提升,对于护患之间关系的改善也有着积极的帮助,值得推广使用。

关键词:临床护理路径;慢性化脓性中耳炎;护理效果

慢性化脓性中耳炎是人体中耳黏膜以及骨膜有慢性化脓性的炎症反应,会导致患者听力的持续下降,同时对于患者生活质量的持续提升有着极大的阻碍^[1-2]。虽然经多种治疗能取得比较显著的效果,不过要想帮助患者彻底改善疾病,还是需要做好患者护理工作的工作。为此我院选取了数名患者作为研究对象进行了护理方案的制定和研究,制定的护理措施主要内容阐述如下:

1. 资料与方法

1.1 一般资料

研究起止时间控制在2018年11月-2019年8月,将我院收治的慢性化脓性中耳炎患者作为研究对象,并选取其中的84例进行临床研究,按照随机分组法将所有患者分为A组(n=42例)和B组(n=42例)。其中A组中男性病患和女性病患人数均为21例,患者的年龄为30-71岁,均值为(50.28 ± 1.39)岁。另一组B组中男女病患人数分别为22例和20例,患者的年龄为31-70岁,均值为(50.37 ± 1.51)岁。相较于两组患者性别、年龄等一般资料,经检查显示二者之间数据的比较并无可比性($P > 0.05$)。

1.2 护理方法

B组:常规护理措施在患者疾病改善过程中的运用。即向患者讲解疾病治疗的方式,并对患者的生命体征进行密切的监测,以防止患者出现意外情况。A组:临床护理路径措施的运用。(1)构建临床护理路径小组。选择科内的医护人员作为护理小组的成员,并以护士长为小组组长,并指导小组成员学习临床护理路径的工作内容以及收集和整理患者的相关资料,进而根据患者的实际情况采用明确分工合作的模式开展临床护理路径。(2)健康宣教。护理人员学习完相关知识之后对患者实施疾病的护理,为确保患者对于自身的疾病拥有更为深入的了解和认识,避免患者因为对疾病缺乏了解而影响疾病治疗的依从性,需要向患者讲解与慢性化脓性中耳炎有关的知识,同时向患者讲解治疗疾病的方法,以提升患者疾病治疗的积极性,并积极投入其中。(3)饮食指导。患者经过治疗后身体较为虚弱,而疾病要得到改善需要保证患者拥有充足的营养,为此护理人员需要根据患者的饮食习惯和当前的身体健康状况为患者制定科学的饮食方案,嘱患者进食高蛋白、高热量、高维生素的半流质或流质饮食。并且将患者的食物温度控制在适当的范围,以免对患者造成刺激,影响患者的恢复。

1.3 观察指标

(1)分析和比较两组患者护理后对护理人员工作的满意度。(2)对两组患者护理后的护理质量评分进行对比。经自制的护理质量评价表评价护理质量,评分范围为0-100分,分数高则护理质量高。

1.4 统计学分析

统计学软件为SPSS24.0,并对我所进行研究后产生的数据进行记录和统计。计量资料表示形式:($\bar{x} \pm s$);计数资料表示形式:

%。而进行数据检验期间,则采用t值以及卡方值 χ^2 予以代表,并且使用 $P < 0.05$ 表示两组数据之间的比较具有可比性。

2. 结果

2.1 对比和分析两组患者对护理人员工作的满意度

在对护理人员工作满意度的比较方面,相较于B组护理后的满意度76.19%(32/42),A组护理后的满意度97.62%(41/42)显著更高,体现了两组患者之间的对比具有可比性($P < 0.05$)。

2.2 两组患者护理后护理质量评分的对比

在护理质量的比较方面,A组的护理质量评分显著高于B组,表明两组患者之间的差异具有可比性($P < 0.05$),如表1所示。

表1 两组患者护理后护理质量评分的对比($\bar{x} \pm s$,分)

组别	例数	护理质量评分
A组	42	92.44 ± 3.36
B组	42	81.59 ± 2.18
T值		17.56
P值		0.00

3. 讨论

作为临床上的一种常见疾病,慢性化脓性中耳炎对于患者的身体健康有着较为严重的影响,随着病情的持续严重还会导致颅内、颅外相关并发症问题的出现,甚至严重威胁患者的生命安全,需要医护人员给予患者针对性的治疗和护理。而随着护理人员护理技术水平的持续提升,在临床上对患者实施临床护理路径这一新型的护理措施越来越受到护理人员的重视,并且得到广泛的运用。

临床护理路径在使用期间主要是从患者入院开始入手对患者进行护理,通过组建护理小组的方式进行全面、系统护理路径计划的制定,通过健康宣教以及饮食指导等措施给予患者科学护理措施,不仅有利于帮助患者提高对疾病治疗工作的依从性。同时在恢复期间也能够帮助患者获取更多的营养物质,符合患者病情恢复需求,对护患之间关系的改善也有着积极的帮助,有利于患者病情的康复,对于护理人员护理质量的持续提升也有着显著的效果。

结合研究,在患者对护理人员工作满意度和护理质量提升效果的比较方面,相较于常规护理措施的运用,临床护理路径措施的运用效果更具优势($P < 0.05$)。以此表明,临床护理路径在慢性化脓性中耳炎患者中的运用,有利于患者护理质量的持续提升,对于护患之间关系的改善也有着积极的帮助,值得推广使用。

参考文献:

[1]潘亚琴,夏静,钱婷.临床护理路径对慢性化脓性中耳炎患者护理质量及满意度的影响[J].齐齐哈尔医学院学报,2015,36(34):5278-5279.

[2]张秀媚.临床护理路径对慢性化脓性中耳炎患者护理质量及满意度的影响分析[J].中国现代药物应用,2018,12(22):155-156.