

盐酸左氧氟沙星在盆腔炎治疗中的临床疗效及安全性评估

连保英

(邯郸市魏县 魏县人民医院)

摘要: 目的: 分析盐酸左氧氟沙星在盆腔炎治疗中的临床疗效。方法: 选取 2018 年 4 月~2019 年 4 月在我院诊治的 68 例盆腔炎患者作为研究对象, 采取随机分组的方式, 观察组 34 例采用盐酸左氧氟沙星治疗, 对照组 34 例采用氧氟沙星治疗, 并对患者临床疗效的安全性研究分析。结果: 观察组和对照组通过总有效率对比分析, 观察组效果更佳显著, 观察组和对照组不良反应对比分析, 观察组不良反应率低于对照组, 对比结果差异明显, 数据对比后具有统计学意义且 $P < 0.05$ 。结论: 采用盐酸左氧氟沙星治疗盆腔炎患者, 治疗效果显著, 且安全性较高, 值得临床应用推广。

关键词: 盐酸左氧氟沙星; 盆腔炎; 临床效果; 安全性

盆腔炎是妇科较为常见的临床疾病, 该种疾病围绕慢性盆腔炎和急性盆腔炎, 并且该病症容易反复发作, 严重影响患者的日常生活。在临床诊治过程中, 医师应从患者实际情况入手, 对患者病情给予有效诊断, 根据诊断结果合理用药。盆腔炎采用药物治疗效果极为有效, 尤其是盐酸左氧氟沙星治疗盆腔炎效果更为突出。本次实验选取我院诊治的 68 例盆腔炎患者作为研究对象, 对两组患者分别采用盐酸左氧氟沙星和氧氟沙星进行治疗, 分析比较两组临床治疗的安全性, 其报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选取 2018 年 4 月~2019 年 4 月在我院诊治的 68 例盆腔炎患者作为研究对象, 采取随机分组的方式, 观察组 34 例采用盐酸左氧氟沙星治疗, 年龄 22~43 岁, 平均年龄 (32.8 ± 4.9) 岁。对照组 34 例采用氧氟沙星治疗, 年龄 23~40 岁, 平均年龄 (33.1 ± 4.2)。所有临床患者均符合研究标准, 两组患者一般资料对比无统计学意义且 $P > 0.05$ 。

1.2 方法

本次观察研究中, 观察组患者应用盐酸左氧氟沙星进行治疗,

在 100ml 的生理盐水中加入 0.2g 盐酸左氧氟沙星注射液对患者进行静脉滴注, 一天两次, 半个月为一个疗程。对照组患者采用氧氟沙星进行治疗, 在 100ml 的生理盐水中加入 0.4g 盐酸左氧氟沙星注射液对患者进行静脉滴注, 一天两次, 5 天为一个疗程。两组患者盆腔炎治疗结束之后医护人员对其观察临床疗效^[1]。

1.3 临床观察指标

本次观察研究评价机制结果分析, 显效: 患者所有疾病症状消失, 没有出现病情恶化状况。有效: 患者病情有显著好转。无效: 临床诊治效果没有效果, 患者依旧存在其他炎症。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 25.0 软件分析数据, 计量资料采用均数 ± 标准差表示, 组间比较采用 t 检验。计数资料采用 X² 检验。P < 0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

本次研究中, 观察组总有效率为 88.23%, 对照组总有效率为 79.41%, 观察组具有明显优势, 两组对比结果具有统计学意义 (P < 0.05)。

表 1 两组患者治疗对比分析表

组别	例数 (n)	显效 n (%)	有效 n (%)	无效 n (%)	总有效率 n (%)
观察组	34	19 (55.88)	11 (32.35)	4 (11.77)	30 (88.23)
对照组	34	12 (35.29)	15 (44.12)	7 (20.59)	27 (79.41)
X ²					6.3541
P					0.02

在本次观察研究中, 观察组不良反应率为 2.94%, 对照组不良反应率为 20.59%, 观察组不良反应明显低于对照组的不良反应, 对比结果差异明显, 具有统计学意义 (P < 0.05)。

表 2 两组患者不良反应率对比分析表

组别	例数 (n)	腹痛膨胀 n	头晕 n	肝功能异常 n	不良反应率 (%)
观察组	34	0	1	0	2.94
对照组	34	3	3	1	20.59
X ²					6.1248
P					0.01

3 讨论

盆腔炎作为常见的妇科临床疾病, 最近几年发病率有所提升。由于该病经常反复发作, 严重影响患者日常生活以及身体健康。盆腔炎是子宫周围的结缔组织以及凝固型盆腔生殖器出现炎症, 如患者月经期间不注意个人卫生, 流产手术感染以及腹膜炎疾病诱发盆腔感染等诸多原因。假如患者不及时治疗, 就令身体出现其他炎症, 严重危及患者身体健康^[2]。

患者在治疗盆腔炎时采用盐酸左氧氟沙星具有显著疗效, 由于该类药物属于抗菌类药物, 特别是针对革兰阴性菌有着很好的抵抗作用。该药的要药效机理在与氧氟沙星的左旋体为盐酸左氧氟沙星, 具有显著的抗菌活性。通过临床研究证明, 治疗盆腔炎使用盐酸左氧氟沙星, 有着极为显著的疗效, 药物成分较为突出, 对患者局部用药效果更佳显著且没有任何不良反应。医护人员对患者进行临床诊治时, 应根据患者的实际病情入手, 并且掌握每种药物的药物机理属性, 待确定患者病情之后在进行用药。由于盆腔炎发病情况比较特殊, 当急性盆腔炎发作时, 患者就会出现肌肉紧张, 以及

月经紊乱等诸多现象。为此, 医护人员在为患者诊治过程中, 还要详细了解患者以往病情, 然后在结合患者病情出现的变化进行用药。另外, 还有一部分女性患者平时心理压力很大, 在反复治疗后, 仍旧没有效果, 以至于患者再次治疗时仍旧担心不已。针对这种情况, 医护人员应该对患者进行心理疏导, 告知患者正确用药方法, 在治疗期间, 患者应忌口辛辣以及海鲜类食品, 注意腹部保暖, 多吃水果, 保持愉悦的心情, 以此增加患者治疗信心, 减轻患者心理压力, 使其在治疗过程中始终保持愉悦的心情^[3]。

本次研究显示, 观察组和对照组通过总有效率对比分析, 观察组效果更佳显著, 观察组和对照组不良反应对比分析, 观察组不良反应率低于对照组, 对比结果差异明显, 数据对比后具有统计学意义且 P < 0.05。此对比结果说明, 盐酸左氧氟沙星对治疗盆腔炎疾病具有明显优势^[4]。

根据以上内容综合所述, 采用盐酸左氧氟沙星治疗盆腔炎患者, 治疗效果显著, 且安全性较高, 值得临床应用推广。

参考文献:

- [1]高莹莹.盐酸左氧氟沙星在盆腔炎治疗中的临床疗效及安全性评估[J].中外女性健康研究,2019(04):30+32.
- [2]努尔古丽·卡依提.盐酸左氧氟沙星在盆腔炎治疗中的临床疗效及安全性体会[J].世界最新医学信息文摘,2019,19(10):99+101.
- [3]李艳梅,欧洁贤,刘海燕,刘裕敏.盐酸左氧氟沙星在盆腔炎治疗中的临床疗效及安全性评价[J].数理医药学杂志,2018,31(09):1362-1363.
- [4]高鑫.盐酸左氧氟沙星在盆腔炎治疗中的临床效果分析[J].中国现代药物应用,2018,12(16):94-96.