

# 消化内科的临床诊断及用药方法的探讨

田芳

(荆门市口腔医院 湖北 荆门 448000)

**【摘要】**目的:有针对性的分析和探讨消化内科的临床诊断及用药方法, 希望能够为临床实践提供一定参考。方法:着重选取我们医院在 2018 年 1 月到 11 月这个时间段内接收的消化内科患者 70 例作为研究对象, 按照数字随机的方法针对所有患者分成对照组和观察组, 每个组平均各有 35 例患者, 其中针对对照组患者采取常规用药方法, 而针对观察组患者采取针对性用药方法, 有针对性的结合患者具体的临床诊断情况, 进行更科学合理的用药处理, 两组患者经过相对应的治疗和用药之后, 对其所呈现出的用药效果以及治疗总有效率等相关情况进行相对应的分析和对比。结果:经过相对应的分析和对比, 能够明显看出, 观察组患者在用药效果, 治疗总有效率等相关方面要十分显著的优于对照组, 在用药的安全性, 有效性等方面有更大程度的提升,  $p < 0.05$ 。结论:在临床实践中, 针对消化内科患者进行有针对性的诊断和用药, 切实有效的采取针对性用药方法, 有更为显著的临床治疗效果, 其用药效果更为明显, 这种方法临床价值更为显著, 进一步提升诊断的有效率, 同时把握相关方面的用药原则, 可以确保用药更加安全, 使患者得到更切实有效的用药服务, 在具体的实践过程中, 要进一步推行这种方法, 为患者提供更及时有效的医疗服务, 确保患者早日恢复健康。

**【关键词】**消化内科;临床诊断;用药方法

从医学的层面来看, 在消化内科疾病的诊断和治疗过程中, 所涉及的药物种类十分复杂, 并且用量特别大, 相关的临床医师必须结合实际情况, 更科学合理的用药, 对患者实施针对性用药, 以诊断结果为基础, 确保为患者提供及时有效的药物治疗, 通过这样的方法, 在最大程度上确保临床疗效和用药安全。基于此, 本文有针对性的着重选取我们医院在 2018 年 1 月到 11 月这个时间段内接收的消化内科患者 70 例作为研究对象, 有针对性的分析和探讨消化内科的临床诊断及用药方法, 希望能够为临床实践提供一定参考。现在针对具体研究内容进行如下汇报。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

着重选取我们医院在 2018 年 1 月到 11 月这个时间段内接收的消化内科患者 70 例作为研究对象, 按照数字随机的方法针对所有患者分成对照组和观察组, 每个组平均各有 35 例患者, 患者中有男性 36 例, 有女性 34 例, 年龄最大的是 74 岁, 年龄最小的是 27 岁, 平均年龄是 48.35 岁。所有患者和家属都是在知情同意的情况下进行本次研究, 并签署知情同意书, 经我院伦理委员会审核通过。两组患者的一般资料进行对比, 并没有显著的统计学差异,  $p > 0.05$ , 可以分析对比。

### 1.2 方法

针对对照组患者采取常规用药方法, 而针对观察组患者采取针对性用药方法, 有针对性的结合患者具体的临床诊断情况, 确保诊断结果更科学合理, 更精准有效, 以此为基准, 进行更科学合理的用药处理。在具体的诊断过程中, 要就患者的具体情况采取更科学合理的检测方式, 针对患者的血、尿常规相关方面进行着重检查, 并有针对性的进行 B 超、胃镜、X 线片等的检查, 在细节方面进一步确保其精准性和科学性, 以此为治疗方案的制定以及用药方法的选择提供科学合理的依据。

### 1.3 观察标准

两组患者经过相对应的治疗和用药之后, 对其所呈现出的用药效果以及治疗总有效率等相关情况进行相对应的分析和对比。

### 1.4 统计学处理

将本次研究的数据全部有针对性的录入到 SPSS23.0 软件, 对其进行分析和处理, 计量资料用 ( $s \pm x$ ) 表示, 采用 t 检验, 计数资料用 % 表示, 采用  $\chi^2$  检验。用  $P < 0.05$  代表对照组和观察组的比较有显著的统计学差异。

## 2 结果

经过相对应的分析和对比, 能够明显看出, 观察组患者在用药效果, 治疗总有效率等相关方面要十分显著的优于对照组, 在用药的安全性, 有效性等方面有更大程度的提升,  $p < 0.05$ 。

## 3 讨论

从根本上来讲, 在消化内科疾病患者的临床诊断过程中, 各项诊断事项是比较常见的, 但是, 在具体的诊断环节有很大程度的多

样性和复杂性特征, 要着重结合患者的具体临床症状表现, 做出科学合理的检查, 以检查结果为基准, 做出更科学合理的综合性分析, 如果在某一个环节出现错误, 极有可能导致误诊问题, 这样就会使患者的治疗时机被错过, 导致其出现用药错误等相关问题。在具体的诊断过程中, 要着重分析和探讨患者的病史, 临床症状等, 结合具体情况进行消化道灌肠检查, 钡剂造影, 消化道彩超、B 超等相关方面的检查, 同时也要结合具体情况有效采取尿常规、血常规等实验室检查以及 B 超、肠镜、CT、X 线片等检查手段, 确保检查和诊断结果更精准有效, 这样才能真正意义上为患者提供科学合理的用药。临床医生要进一步与药师保持密切的合作和联系, 确保科学合理的用药机制能够有效落实, 在最大程度上为患者提供更精准有效的用药服务, 确保用药方案更科学规范, 从根本上有效避免不科学合理的用药, 对于患者的治疗效果造成严重的负面影响, 甚至对其生命健康造成严重威胁。在我们这次研究中, 针对对照组患者采取常规用药方法, 而针对观察组患者采取针对性用药方法, 有针对性的结合患者具体的临床诊断情况, 进行更科学合理的用药处理, 两组患者经过相对应的治疗和用药之后, 能够明显看出, 观察组患者在用药效果, 治疗总有效率等相关方面要十分显著的优于对照组, 在用药的安全性, 有效性等方面有更大程度的提升,  $p < 0.05$ 。

## 4 结论

通过上文针对整个研究过程的探究, 进一步充分显示出, 在临床实践中, 针对消化内科患者进行有针对性的诊断和用药, 切实有效的采取针对性用药方法, 有更为显著的临床治疗效果, 其用药效果更为明显, 这种方法临床价值更为显著, 进一步提升诊断的有效率, 同时把握相关方面的用药原则, 可以确保用药更加安全, 使患者得到更切实有效的用药服务, 在具体的实践过程中, 要进一步推行这种方法, 为患者提供更及时有效的医疗服务, 确保患者早日恢复健康。

## 参考文献

- [1]周香红. 消化内科不合理用药的临床分析[J]. 科学中国人, 2015, 0(4X).
- [2]葛瑞平. 消化内科的临床诊断及用药方法的探讨[J]. 临床医药文献电子杂志, 2014, 1(7):1094, 1097.
- [3]葛瑞平. 消化内科的临床诊断及用药方法的探讨[J]. 临床医药文献杂志(电子版), 2014, 1(011):1094.
- [4]祝伟. 消化内科患者的临床诊断及用药情况探讨[J]. 中国保健营养, 2016, 26(16):157.
- [5]陈家林. 探究消化内科患者的临床诊断方法和用药情况[J]. 大家健康(下旬版), 2016, 10(9):78-78.
- [6]邓政伟, 陈志君, 林党新, 等. 常见消化内科不合理用药问题分析[J]. 现代诊断与治疗, 2013, 24(6):1300-1301.