

安全护理中静脉治疗护理风险防范预案的应用分析

金钱倩

(华中科技大学同济医学院附属武汉中心医院 430000)

【摘要】目的:对安全护理中静脉治疗护理风险防范预案的应用进行探讨。方法:于我院2016年6月~2017年月所接受的静脉治疗患者中随机选取66例为研究对象,并以患者各自选取的护理方式为依据进行了平均分组,给予对照组患者常规安全护理,给予观察组患者护理风险防范预案安全护理,并对两组患者的护理满意度和发生护理风险的情况进行观察和分析。结果:对照组的查对失误发生率和错注液体发生率分别是15.15%和9.09%,而观察组的查对失误发生率和错注液体发生率分别是3.03%和0;对照组的护理满意度是75.76%,而观察组护理满意度是96.97%;经过对比两组患者的各项数据值,差异显著,统计学均具有意义($P < 0.05$)。结论:患者在接受安全护理的过程中,通过应用静脉治疗护理风险防范方案取得了较为理想的效果,不仅可以减少发生护理风险的几率,还可以促进患者护理满意度的提升,因此,在日后的临床护理中值得进行应用和推广。

【关键词】安全护理;静脉治疗护理;风险防范预案;应用效果

静脉输液治疗在临床上极为常见的一种治疗方案,输液系统是由大气压和液体静脉所构成的,由于该系统内压和患者的静脉压之间存在着一定的压力值差,并在此作用下,可以在患者的静脉中输入无菌溶液或药液,从而使患者的病情得到治疗和改善^[1]。对此,笔者在本文中针对安全护理中静脉治疗护理风险防范预案的应用效果进行了观察和分析,报道如下。

1 资料和方法

1.1 临床资料

于我院2016年6月~2017年月所接受的静脉治疗患者中随机选取66例为研究对象,

并以患者各自选取的护理方式为依据进行了平均分组,在对照组的33例患者中,有22例男性,11例女性,年龄在25~55岁之间,平均年龄是(32.1±3.6)岁;而在观察组的33例患者中,有20例男性,13例女性,年龄在27~57岁之间,平均年龄是(35.7±3.8)岁。通过对比两组患者的年龄、性别等一般资料,并无显著差异,统计学具有意义($P > 0.05$)。具有可比性。

1.2 研究方法

给予对照组患者常规安全护理,所包含的内容有保持病房内的干净整洁,认真

真观察患者的治疗情况等^[2];给予观察组患者护理风险防范预案安全护理,护理的详细流程如下:

1.2.1 分析护理风险

相关护理人员为了能够更好的编制静脉治疗护理风险防范预案,需要与以前

发生的护理风险事件相结合,对导致静脉治疗护理风险发生的原因和所占比例进行总结分析。与此同时,与相关资料相结合进而制定良好的防范预案。通过分析可以得知,常见的原因有同时进行两种不同药物的输注、保存药物时出现差错、查对时出现失误、液体错注或是漏注等。

1.2.2 指标观察

a.对两组患者发生护理风险的情况进行观察,主要包含的内容查对失误和

液体错注。b.对两组患者的护理满意度进行观察,包含的内容非常满意、满意或不满意,护理满意度=(非常满意+满意)/总例数×100%^[3]。

1.3 统计学分析

使用SPSS19.0统计学软件对本次研究中的相关数据, ($x \pm s$)表示计量资料,用t检验,使用 χ^2 检验计数资料,当 $P < 0.05$ 时,统计学意义成立。

2 结果

2.1 比较两组患者发生护理风险的情况

两组患者均接受为期1个月的治疗之后,对照组的查对失误发生率和错注液

体发生率分别是15.15%和9.09%,而观察组的查对失误发生率和错注液体发生率分别是3.03%和0,通过比较,差异显著,统计学具有意义($P < 0.05$),详情见表1:

2.2 比较两组患者的护理满意度

在本次研究中,对照组的护理满意度是75.76%,而观察组护

理满意度是96.97%;经过对比差异显著,统计学具有意义($P < 0.05$),详情见表2:

表1 比较两组患者发生护理风险的情况[n(%)]

组别	例数	查对失误	液体错注
观察组	33	1 (3.03)	0 (0)
对照组	33	5 (15.15)	3 (9.09)
χ^2			2.63
P		0.013	0.009

表2 比较两组患者的护理满意度

组别	例数	非常 满意	满意	不满意	满意度 (%)
观察组	33	12	20	1	96.97
对照组	33	9	16	8	75.76
t					4.371
P					0.017

3 讨论

3.1 优化安全护理的有效措施

3.1.1 优化管理措施

为了减少静脉输液治疗过程中所发生的护理风险事件,医院管理护理人员的力度需要进一步加强。通过对责任制度的有效利用,促进护理人员责任意识的提升,进而促进护理服务质量的提高。

3.1.2 规范书写护理文书,增加制度执行力度的有效措施

在进行护理文书记录的过程中,工作人员必须要客观、及时,不能随便涂改,防止内容中出现主观思想,尤其是抢救危重患者的记录一定要符合实际情况,不能使用胶贴、涂改等方式将原字去除,去除原字时可以使用双划线划去,并在修改的地方签上自己的名字。

3.2 编制静脉治疗护理风险防范预案的意义

为了对安全护理中静脉治疗护理风险防范预案的应用效果进行有效分析,笔者在本文中接受静脉治疗的66例患者归入研究中,并展开了合理的分析。通过研究结果显示,对照组的查对失误发生率和错注液体发生率分别是15.15%和9.09%,而观察组的查对失误发生率和错注液体发生率分别是3.03%和0;对照组的护理满意度是75.76%,而观察组护理满意度是96.97%;经过对比两组患者的各项数据值,差异显著,统计学均具有意义($P < 0.05$)。由此可见,应用静脉治疗护理风险防范预案所得到的临床效果明显要好于常规安全护理,不仅可以减少发生护理风险的几率,还可以促进患者护理满意度的提升,进而使患者的生活质量得到了有效的改善。

参考文献:

- [1] 殷斯娟. 静脉治疗护理风险防范预案在安全护理中的作用[J]. 心理医生, 2017, 23(18):216-217.
- [2] 陈丽琴. 静脉治疗护理风险防范预案在安全护理中的作用[J]. 成都医学院学报, 2013, 8(3):361-362.
- [3] 陈云芳. 静脉治疗护理风险防范与安全管理案例分析[J]. 中国护理管理, 2017, 17(2):160-163.