

上消化道出血急诊护理的效果分析

曹妮娜

(莱芜钢铁集团有限公司医院急诊科 山东济南 276300)

【摘要】目的 对上消化道出血患者应用急诊护理的效果进行研究分析。方法 本次研究所选的上消化道出血患者共有 66 人,在 2018 年 12 月到 2019 年 3 月期间先后来到我院进行治疗,根据就诊时间先后来交替采用急诊护理和常规护理,然后对各组患者的满意度评分进行统计和分析,以此来评估各种护理方法的效果。结果 本次研究所产生的所有数据都在表 1 中得到了体现和说明,对比分析可以发现采用急诊护理措施的患者所给出的满意率明显较高,并且按照统计学算法计算所得到的 p 也小于 0.05,说明该数据在统计学中有意义。结论 急诊护理在上消化道出血患者护理中具备非常好的实用性和适用性,可以更好获得患者的认同和满意,是提升临床护理水平的有效方法。

【关键词】急诊护理;上消化道出血;满意度

上消化道出血属于消化道疾病的一种,它会影响患者的消化道功能,破坏患者的消化道系统,并且该病症还会对患者体内器官产生感染,如果感染情况比较严重,还容易引发患者的休克死亡。因此及时采取相应的护理措施对于帮助上消化道出血患者恢复有着极其重要的作用。基于此,文章就探究了急诊护理在上消化道出血护理中的应用效果,具体研究过程和研究成果可参考下文。

1 资料与方法

1.1 一般资料

从我院 2018 年 12 月到 2019 年 3 月期间,先后来到我院治疗的上消化道出血患者中选取 66 人作为此次研究的对象,并根据就诊时间交替采用急诊护理的常规护理两种模式。在 66 名患者中,男性患者共有 39 人,女性患者有 27 人,年龄最大的患者 64 岁,年龄最小的患者 17 岁,人均年龄 (45.8 ± 5.48) 岁。对上述一般资料按照统计学中 p 值计算方法分别计算各项指标对应的 p 值,均超过了 0.05,说明其并不具备统计学中的差异。

1.2 方法

采用常规护理措施的患者被划分为常规护理组,护理项目如下:体征监测、药物指导、情绪变化监测、病情监测等等。

采用急诊护理措施的患者被划分为急诊护理组,护理工作从下述几方面入手:首先,充分执行预见性护理程序,尽职尽责完成护

理工作,做好对患者病情的实时监测,及时将病情变化反馈给主治医师;其次,做好对患者上呼吸道和口腔内的清洁清理,将其中残留血块或者异物清理干净,为治疗工作提供良好条件。再者,迅速对患者的血型进行确定,并准备输血相关的各项工作。对患者的情绪状态进行有效评估,如果患者情绪异常,波动性非常大,则可以为患者服用适当的镇静剂,使患者可以在整个治疗过程中维持一个稳定状态,避免因此而影响治疗工作的开展。最后,在康复治疗阶段,需要做好对患者各项体征指标的实时检测,以确认患者相关指标状态是否正常,如果出现异常情况,可以迅速处理。同时还需要指导患者的卧姿和坐姿,使其采用侧睡或者侧坐的方式进行休息,以促进患者的康复。此外还需要将饮食注意告知患者,避免因为饮食不到而影响患者的康复。

1.2 参比指标

满意度评分:满意度评估表由本院自制,分为满意、基本满意和不同意三个档次。

1.3 统计学方法

本次研究中所用到的是 SPSS22.0 统计学软件,检验结果所采用的表示方式为 $(n\%)$,该形式的数据结果在统计学上检验方式为 χ^2 。

2 结果

表 1 护理满意度比较 $[n(\%)]$

组别	n	满意	基本满意	不满意	总满意
急诊护理组	33	22 (66.66)	8 (24.24)	3 (9.1)	30 (90.91)
常规护理组	33	12 (36.36)	12 (36.36)	9 (27.27)	24 (72.73)
χ^2					2.68
P					0.0010

结论:对比分析上表中数据可以发现,采用急诊护理措施的患者中,有 30 人都给出了满意评分,而在采用常规护理措施的患者中,仅有 24 人给出满意评分,两组的满意度分别为 90.91% 和 72.73%,明显可以发现急诊护理措施的实效性更强。

3 讨论

上消化道出血作为一种非常严重的病症,对于患者可能造成的致死性威胁,患者在出现上消化道出血后,会出现血便、失血性周围循环衰竭、发热等情况,必须得到尽快的救治和护理,这样才能可以避免病情的进一步扩大,及时挽救患者的生命。作为护理人员应该熟练掌握与上消化道出血护理相关的知识和技能,这样才能可以保证护理工作的有效性和时效性。同时,护理人员还需要实时监测患者的体征变化、病情改变,以便于在出现异常情况时可以迅速做出应对,以免患者的病情出现恶化。

为了更好促进上消化道出血患者的康复,为其提供更加高效、优质的护理服务,我院就对上消化道出血患者应用急诊护理的效果进行研究分析。在应用急诊护理时,需要从以下几方面入手:护理人员需要完全落实和执行既定的预见性护理措施,尽职尽责完成护理工作,做好对患者病情的实时监测,及时将病情变化反馈给主治医师,有效降低并发症的出现情况;为了为治疗工作提供便利,护理人员还是要做好对口腔和上消化道的清理,将残留的异物和血

块清理干净;护理人员还需要评估患者状态,准备好输血相关的各项指导。此外,护理人员还需要从饮食、常行为方面入手,提供有效的指导和帮助。在本次研究的 66 名患者中,采用急诊护理的患者在接受护理服务后,有 30 名患者都给出了满意评分,满意度达到了 90.91%,而采用常规护理的患者,在护理服务结束后,仅有 24 名患者给出了满意评分,满意度仅为 72.73%,显而易见,急诊护理更加有助于获得上消化道出血患者的认同,在临床中更具时效性和有效性。

综上所述,在上消化道患者护理工作中应用急诊护理措施具有非常好的实用性和适用性,具备临床推广应用的价值。

参考文献

- [1]何燕.探讨上消化道出血的急诊护理措施及临床效果观察[J].中国医药指南,2015,13(13):42-43.
- [2]雷菊蕊,钟淑琼,吕华.症状护理在急诊护理中的应用价值[J].中国当代医药,2012,19(17):113,115.
- [3]郝会.上消化道大出血的急诊护理[J].世界临床医学,2016,10(7):194.
- [4]孙丽娟.上消化道出血的急诊护理措施及效果观察[J].临床医药文献电子杂志,2016,3(27):5414-5415.