

柴胡加龙骨牡蛎汤加减治疗肝阳上亢型后循环缺血眩晕的效果分析

全新朵

(河南中医药大学第三附属医院 450008)

【摘要】：目的：肝阳上亢型后循环缺血眩晕治疗中，选用不同治疗模式，总结柴胡加龙骨牡蛎汤加减实施效果。方法：于 2019 年度 1 月至隔年 12 月期间选择 70 例因肝阳上亢型后循环缺血眩晕病人进行调研，以信封分组方式将其分为 2 组：对比组 35 例病人选用常规治疗，研究组 35 例病人则采用柴胡加龙骨牡蛎汤加减治疗。总结治疗结果。结果：对比组与研究组治疗构成比对照，构成比较低，两组数值对照组间存有差异，（ $P<0.05$ ）。结论：肝阳上亢型后循环缺血眩晕治疗中，柴胡加龙骨牡蛎汤加减方案实施效果优异，此方案值得临床应用与普及。

【关键词】：肝阳上亢型后循环缺血眩晕；柴胡加龙骨牡蛎汤

在临床治疗中，后循环缺血属于常见且多发的缺血性脑血管病，占总缺血性卒中的 25%左右^[1]。此疾病和穿支动脉病变、栓塞、动脉粥样硬化有直接关系，此疾病临床表现为多样化，以眩晕、头晕、感觉障碍、运动障碍为主^[2-3]。从中医角度来讲，对其进行分型，以肝阳上亢型后循环缺血眩晕为常见^[4]。肝阳上亢型后循环缺血眩晕在临床治疗中以对症治疗为主，在此为了提升治疗效果，则选用不同治疗方案，如下^[5]。

1 资料与方法

1.1 一般资料

于 2019 年度 1 月至隔年 12 月期间选择 70 例因肝阳上亢型后循环缺血眩晕病人进行调研，以信封分组方式将其分为 2 组，对比组：性别为男性者：18 例、女性者：17 例，年龄在 61 岁至 70 岁之间，中位年龄为 65.22 岁。研究组：性别为男性者：17 例、女性者：18 例，年龄在 62 岁至 71 岁之间，中位年龄为 65.21 岁。对比组与研究组病人一般资料经对比结果证实，并无差异，（ $P>0.05$ ）。

1.2 方法

对比组 35 例病人选用常规治疗，即为活血化瘀、神经营养、改善脑循环、

抗血小板聚集等治疗。

研究组 35 例病人则采用柴胡加龙骨牡蛎汤加减治疗，如下：牡丹皮为 10g、姜半夏为 10g、全蝎为 2g、大黄为 5g、赤芍为 12g、桃仁为 12g、生龙骨为 21 个、生牡蛎为 21g、茯苓为 11g、黄芩为 11g、桂枝为 11g、柴胡为 11g，将上述中药用水煎煮，取汁液服用。

1.3 观察指标

分析治疗结果。从治疗有效率进行分析。

1.4 统计学方法

本次实验选所使用的统计学软件为 SPSS 22.0 系统，在软件计算器中，将对对比组与研究组实验数据均统一核对并输入，再进行统计学分析与检验。文中所涉及到的计量资料，均采用均数±标准差方式进行表述，采用 t 检验方式。计数资料，均采用百分比/%表述方式，采用 2 检验，当 P 值小于 0.05 时，说明本差异，存有统计学意义与价值。

2 结果

对比组：35 例病人中，治疗有效例数为 25 例，治疗构成比为 71.43% (25/35)，其中显著、显效分别为 13 例与 12 例，无效者为 10 例；研究组：35 例病人中，治疗有效例数为 34 例，治疗构成比为 97.14% (34/35)，其中显著、显效分别为 22 例与 12 例，无效者为 1 例。对比组与研究组治疗构成比对照，构成比较低，两组数值对照组间存有差异，(P<0.05)。

3 讨论

后循环缺血眩晕在临床治疗中属于常见且多发疾病，此属于缺血性脑血管疾病，病人在发作此情况后如果得不到及时有效的治疗，将出现反复发作情况，进而诱发与引起脑梗死，部分情况严重者会因此威胁到生命安全。基于上述情况，积极、良好且科学与合理的抗眩晕治疗，在预防脑血管病变中起到积极作用。

据目前情况来看，临床认为后循环缺血眩晕和颈椎病会给椎动脉以及椎一基底动脉造成直接的影响，进而诱发与引起粥样硬化，并发生栓塞、血流动力学异常、血管狭窄等情况，而且以上情况还会诱发与引起脑干局部、小脑局部等位置的血液循环障碍，降低脑灌注，从而引发眩晕症状。故而，如何改善与调节后循环系统血液供，是治疗与改善眩晕的关键。就目前临床治疗来看，在后循环系统

缺血治疗中，尚无针对性治疗药物，常用治疗手段为前循环缺血、扩张血管药物等，以便达到改善脑部供血量，进而实现改善与调节椎基底动脉血流量的功效，以此达到改善眩晕症状。虽然以上治疗方式有一定功效，但效果不佳，故而我们采用了中医治疗模式。本方剂中，牡丹皮可以起到通经止痛、凉血、散瘀、活血、清热的功效。姜半夏可以起到降逆止呕、温中散寒的功效。全蝎可以起到息风镇痉、通络止痛、攻毒散结的功效。大黄可以起到泻下攻积、清热泻火、止血解毒、活血祛瘀的功效。赤芍可以起到清热凉血、散瘀止痛的功效。桃仁可以起到破血行瘀、润燥滑肠的功效。生龙骨可以起到镇惊安神，平肝潜阳，收敛固涩的功效。生牡蛎可以起到镇静安神，益阴潜阳，软坚散结，固涩的功效。茯苓可以起到利水消肿、健脾止泻、养心安神的功效。黄芩可以起到清热燥湿、泻火解毒的功效。桂枝能起到助阳化气，平冲降逆的功效。柴胡可以起到疏肝理气、解郁、退热的功效。上述药物联合应用，可起到改善血液流动，疏通经络，进而扩张血管的作用。

综上所述，肝阳上亢型后循环缺血眩晕治疗中，柴胡加龙骨牡蛎汤加减方案实施效果优异，此方案值得临床应用与普及。

参考文献

- [1]王红胜,吴明华. 柴胡加龙骨牡蛎汤加减治疗肝阳上亢型后循环缺血眩晕疗效观察[J]. 现代中西医结合杂志,2021,30(11):1213-1216.
DOI:10.3969/j.issn.1008-8849.2021.11.016.
- [2]伍超,李志彬,王红胜. 柴胡加龙骨牡蛎汤加减治疗肝阳上亢型眩晕的临床观察[J]. 光明中医,2018,33(10):1416-1417. DOI:10.3969/j.issn.1003-8914.2018.10.022.
- [3]蔡兴黎. 建瓴汤治疗后循环缺血性眩晕临床研究[J]. 光明中医,2020,35(9):1300-1302. DOI:10.3969/j.issn.1003-8914.2020.09.010.
- [4]伍超,李志彬,王红胜. 柴胡加龙骨牡蛎汤加减治疗肝阳上亢型眩晕的临床观察[J]. 光明中医,2018,33(10):1416-1417. DOI:10.3969/j.issn.1003-8914.2018.10.022.
- [5]蒋上润. 治晕合剂治疗后循环缺血性眩晕(肝阳上亢、瘀血阻窍型)的临床研究[D]. 湖北:湖北中医药大学,2012. DOI:10.7666/d.y2100546.

姓名:全新朵

单位:河南中医药大学第三附属医院

电话:18339903815

地址:郑州市金水区东明路 63 号

邮编:450008

、

、