

对在急诊科接受溶栓治疗的急性脑梗死患者进行系统化护理的效果分析

张玉

(徐州医科大学附属宿迁医院 223800)

摘要:目的:探究在护理急诊科采取溶栓治疗的急性脑梗死患者时,采用系统化护理方法对患者病情具有的疗效。方法:将2019年6月至2020年6月间本院收治的60例急性脑梗死患者作为本次研究的对象,根据研究需求将60例患者随机均分成对照组与观察组各30例。对照组护理措施给予常规模式、观察组护理措施给予系统性护理模式,对比两组患者护理后的急救总用时与救护成功率、患者对护理工作的满意度。结果:观察组实施系统化护理后的各项对比指标要显著优于对照组($P < 0.05$)。结论:急诊科在应用溶栓治疗急性脑梗死患者时可给予系统化护理措施,对患者病情的好转具有较好的促进作用。

关键词:急诊科;急性脑梗死;溶栓治疗;系统化护理;护理效果

脑梗死在临床治疗中为常见性的脑血管疾病,患者患病后若未得到及时并有效的治疗,患者器官组织会因缺血而逐渐软化并坏死,还会威胁患者生命安全^[1]。医疗机构在治疗急性脑梗死患者时普遍采用溶栓治疗模式,并且需要在此治疗措施中给予有效的护理方法,进而达到提升救护成功率实现挽救患者生命的目标,以下内容针对系统化护理措施应用于溶栓治疗过程中具有的效果进行了研究。

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2019年6月至2020年6月间本院收治的60例急性脑梗死患者作为本次研究的对象,统计60例患者各项资料数据:计算平均年龄为(60.5±20.5)岁、男女人数分别为35例与25例;患有高血压病史的患者人数为15例、患有糖尿病病史的患者人数为23例;救治时出现深度昏迷的患者人数有8例、救治时出现轻度昏迷且伴随失语的患者人数有20例、意识清醒的患者人数有14例。根据研究需求将60例患者随机均分成对照组与观察组各30例,对比两组各项资料数据并未显示出明显性差异,此次研究可以继续实施。

1.2 方法

对照组与观察组患者治疗中普遍采用溶栓治疗模式,在护理时分别给予对照组与观察组常规护理与系统化护理方法。对照组的护理过程主要为监测患者生命体征,对患者病情状态进行评估等。观察组的护理过程为:(1)协助主治医师开展早期评估病情并开通绿色通道,在最短时间内进入急救室开展抢救工作。(2)快速通知各科室人员做好急救准备工作,并由1名护理人员指导患者家属快速办理各项手续。(3)护理人员护送患者至急救室的过程中,若患者意识处于清醒中要及时给予心理护理过程,增强患者治疗信心及降低不良情绪,保证患者机体应激反应在急救中处于最低化。(4)急救前需要影像科对患者脑组织实施检查工作,护理人员要提前与影像科工作人员协调并告知患者到达时间,保证检查工作及时完成。(5)护理人员要及时与患者家属沟通了解患者病史,并根据患者各项检查结果及溶栓指征构建出针对性的护理方案。(6)护理人员要做好急救前的各项准备工作,在患者进入急救室后要遵医嘱及时建立呼吸通路、开展人工输氧措施、完成血样采集工作,并建立静脉通路及监测患者各项生命体征。(7)护理人员要在患者入院后的4.5h内开展溶栓护理工作,若患者收缩压与舒张压水平分别低于160mmHg与110mmHg以下,护理人员只需要密切监测患者血压无需采取降压措施。若患者舒张压与收缩压水平分别在180mmHg与110mmHg以上时,二次脑出血发生率较高,护理人员应及时与医生沟通并配合医生开展降压治疗工作。患者溶栓治疗中,护理人员要遵医嘱给予患者用药指导提升溶栓治疗效果。

1.3 观察指标

观察两组患者治疗、护理后的急救总用时、救护成功率、护理满意度三项指标。

1.4 统计学分析

需要观察的各项指标数据输入至SPSS20.0软件内完成统计与处理工作,结果的显示方式分别运用均数($\bar{x} \pm s$)与(n,%)表示计量资料与计数资料,两组数据分别采用t值检验与卡方检验进行验证。若SPSS20.0软件显示的数值在0.05以下,表明两组数据对比表现出明显差异。

2 结果

2.1 两组患者急救总用时与救护成功率的对比

从下表数据中可知,观察组急救总用时与救护成功率要显著优于对照组($P < 0.05$),见表1。

表1 两组患者急救总用时与救护成功率的对比($\bar{x} \pm s$)(n,%)

组别	急救总用时	救护成功率
对照组(n=30)	3.58±0.19	86.67(26/30)
观察组(n=30)	1.57±0.18	100.00(30/30)
P值	<0.05	<0.05

2.2 两组患者护理满意度的对比

从下表数据可知,观察组患者对护理过程的满意度要明显优于对照组($P < 0.05$),见表2。

表2 两组患者护理满意度的对比(n,%)

组别	例数	满意	一般	不满意	满意度
对照组	30	10	12	8	73.33
观察组	30	19	10	1	96.67
P值	-	-	-	-	<0.05

3 讨论

急性脑梗死在发病时表现出发病急及具有较高致死率的特点,在治疗中已经普遍采用溶栓治疗方法,但是需要在治疗中给予有效的护理过程保证治疗的效果。

本次研究针对系统化护理模式应用于急性脑梗死溶栓治疗中具有的疗效进行了研究,从结果显示此护理模式显著提升了急救总用时、救护成功率、护理满意度,原因是系统化护理保证患者入院后的每个环节都达到最佳化要求,特别是急性脑梗死患者在发病后的4.5h内开展溶栓治疗具有最佳效果,时间越长其溶栓效果越差^[2]。溶栓治疗是在4.5h内开展的,并且治疗中及时给予了护理过程,最大化地节省了各环节时间并应用于溶栓治疗中,显著提升了患者治疗效果并挽救了患者生命。

综上所述,急诊科在治疗急性脑梗死患者并应用溶栓治疗模式时,应同时给予系统化护理的过程,可显著提升患者治疗效果并成功挽救患者生命。

参考文献:

- [1]刘广玉,刘晓枫.老年急性脑梗死患者急诊溶栓后神经功能恶化的影响因素[J].中国老年学杂志.2021, 41(12): 2487-2490.
- [2]王伟霞,刘万里.血栓通注射液联合尿激酶溶栓治疗急性脑梗死患者的疗效分析[J].临床研究.2021, 29(07): 122-124.