

泌尿外科老年患者手术护理风险因素及其干预效果观察分析

宋豫君

(新疆医科大学附属肿瘤医院泌尿科 830000)

摘要:目的:分析泌尿外科老年患者手术护理风险因素,并对其干预效果进行观察。方法:回顾性分析于我院接受手术治疗的82例老年泌尿外科患者护理风险因素与干预效果,将其以不同护理干预方式分为常规组与观察组,常规组应用传统护理干预,观察组应用手术风险预警与防范干预护理措施,将两组干预效果对比观察。结果:观察组护理风险因素类型主要为过度疲劳,常规组除此外包含护理技术欠缺、服务与法律意识淡薄等,观察组显著少于常规组, $P < 0.05$ 。观察组差错潜在危险问题、护理风险事件发生率显著低于常规组,而手术医师满意度则更高 $P < 0.05$ 。结论:老年泌尿外科患者手术存在安全隐患较多,为提升治疗效果护理人员有必要在术中给予风险预警,降低风险事件发生率。

关键词:泌尿外科;老年患者;手术护理风险;干预效果

目前我国人口老龄化问题不断加深,老年患者数量逐年上升。在临床泌尿外科中老年由于生理与心理承受能力不断下降,加上手术治疗对患者伤害较大,在患者整个护理过程中存在一定安全隐患,对患者治疗效果以及生命健康等均产生明显不利影响。有研究者认为对泌尿外科老年手术患者护理过程中分析其中风险因素并采取规范化护理服务能够保障护理安全性,对促进患者快速康复极为有利,同时对提升临床护理治疗具有重要意义^[1]。本文主要分析临床泌尿外科老年手术护理风险因素的同时对干预效果进行观察,主要研究内容如下:

1 资料与方法

1.1 一般资料

将2020年8月-2021年8月接受手术治疗的泌尿外科老年患者临床资料进行收集整理,并从中筛选符合研究要求的82例患者作为此次研究对象,按照数字随机分配原则将其分为常规组与观察组。常规组中男、女性患者例数分别为24、17例,年龄范围62-79岁,平均 (62.3 ± 5.1) 岁。观察组中男、女性患者例数分别为22/19例,年龄范围61-78岁,平均 (66.4 ± 4.8) 岁。经对比两组患者一般资料差异无意义, $P > 0.05$ 。

1.2 方法

常规组给予传统护理干预方式,主要涉及手术室内温度与湿度的控制,对患者鼻咽部温度监测、普及疾病知识等。

观察组应用预警与防范干预措施,具体如下:

①增强护理人员护理安全风险意识。定期组织培训并通过授课方式对护理人员讲解护理风险相关知识,增强护理人员的认识,尤其面对容易出现护理风险事件的部分能够以敏锐的风险警觉意识进行判断,进而采取合理措施解决护理风险事件。

②提升护理人员沟通能力。引导护理人员面对护患冲突时应能保持耐心、良好态度正确处理,并在处理过程中能够坚持以患者为中心,保证沟通语言礼貌性,及时与患者家属沟通,掌握患者不适情况。针对患者存在的疑问及时解答,并对其不良情绪进行环节,充分满足患者合理要求。

③提高对手术安全认识。加强对护理人员引导培训,使其能够从思想上重视手术室护理风险,提升护理操作安全性。另外结合实际情况对护理工作制度以及风险应急预案进行优化完善,强化护理制度与操作流程的规范化。

④加强基础护理。做好室内基础护理,尽量保持室内通风、干燥,为患者提供良好的治疗环境。对患者讲解手术治疗方法、注意事项以及治疗效果,增强患者对疾病与治疗方式的认识,协助其树立救治信心,并使其能够认可治疗方法并积极配合,减少护患矛盾发生。

1.3 观察指标

观察两组风险因素类型,对比两组护理安全指标结果。其中安全指标结果包含差错潜在危险问题、护理风险事件以及手术医师满

意度。

1.4 统计学分析

以SPSS20.0统计软件进行分析处理,计量资料与计数资料分别采用t值与卡方值检验,组间差异经P值判定。

2 结果

2.1 两组风险因素类型分析

观察组风险因素类型主要有2例过度疲劳,常规组包括1例护理技术与2例法律意识欠缺,1例服务意识淡薄,有3例过度疲劳,明显多于观察组, $P < 0.05$,差异有统计意义。

2.2 两组护理安全指标结果对比

对比两组护理安全指标,常规组差错潜在危险问题以及护理风险事件发生率明显高于观察组,手术医师满意度则较低, $P < 0.05$,数据结果如下表1所示:

表1 两组护理安全指标结果对比(N%)

组别	例数	差错潜在危险问题	护理风险事件	手术医师满意度
常规组	41	6 (14.63)	7 (17.07)	23 (56.10)
观察组	41	2 (4.88)	2 (4.88)	29 (70.73)
χ^2		6.539	4.681	5.371
P		<0.05	<0.05	<0.05

3 讨论

提升泌尿外科患者手术成功率的重要措施则是加强患者护理工作,尤其老年患者自身机能素质较差,在手术护理中存在较多安全隐患与风险,更应注重护理工作安全性,提升护理水平^[2]。为降低患者风险事件发生率还需增强护理人员风险意识,并形成风险预警,重视护理安全操作的同时提升护理服务水平,以此减少甚至避免风险因素。

对数据结果进行分析,临床泌尿科老年患者手术护理风险影响因素相对较多,在本次研究中手术护理风险因素有护理技术欠缺、法律意识欠缺、护理服务意识淡薄,而过度疲劳则是患者主要手术护理风险因素。根据本次研究结果显示观察组手术护理风险因素明显少于常规组, $P < 0.05$ 。对比两组护理安全指标结果,常规组差错潜在危险问题与护理风险事件发生率明显高于观察组,而手术医师满意度则较低, $P < 0.05$ 。

综上,临床泌尿外科老年手术患者护理风险因素较多,主要以过度疲劳为主,同时包括护理技术、法律意识欠缺等,而对患者给予风险预警,加强护理干预能够提升护理操作安全性,整体效果显著。

参考文献

- [1]齐易.护理风险管理在老年泌尿外科手术患者中的应用[J].医疗装备,2020:163-164.
- [2]郑芳芳.护理干预对泌尿外科患者术后疼痛缓解的效果观察[J].基层医学论坛,2020:375-377.