

儿童腹泻病的消旋卡多曲联合用药治疗评价

赵杨平

(崇左市妇幼保健院 532200)

摘要:目的:观察腹泻患儿给予消旋卡多曲联合用药治疗的效果。方法:选取在我院治疗的60例腹泻患儿为对象,入选时间为2020年1月-2020年8月,随机将其划分为两组,对照组(n=30例)接受头孢他啶治疗,研究组(n=30例)在对照组基础上加入消旋卡多曲治疗,对比两组患儿治疗总有效率等指标情况。结果:研究组止泻时间为(48.50±18.94)h,对照组为(72.28±20.11)h,且研究组(93.3%)患儿临床治疗效果优于对照组(70.0%),差异存在统计学意义(P<0.05)。结论:腹泻患儿采用消旋卡多曲联合用药治疗,能有效缓解其临床症状,从而提升临床治疗效果,具有在临幊上推广使用的价值。

关键词:腹泻病; 儿童; 消旋卡多曲; 临床疗效; 止泻时间

腹泻是儿童比较常见的一种疾病,由于儿童全身器官并未发育完善,自身抵抗力低,极易受病毒、细菌的入侵引起疾病^[1]。儿童腹泻病临幊常给予头孢他啶等常规治疗,但这种治疗方法效果还不是很理想,也会诱发全身其他器官的疾病。本文以60例腹泻患儿为对象,探究其给予不同方法进行治疗的效果,以期为类似研究提供一定的参考,现总结报告如下。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

挑选在本院进行治疗的60例腹泻患儿展开研究,纳入时间2020年1月-2020年8月。纳入标准:所有患儿家属均知情本次研究,并签订知情同意书。排除标准:排除肝、肾等功能不全者;排除资料不全者;排除精神疾病及意识障碍者。采用随机分配的方式将其划分为两组,每组30例。对照组有17例男性、13例女性,年龄4个月-7岁,平均年龄(3.20±0.76)岁,病程6h-7d,平均病程(2.27±0.92)d;研究组16例男性、14例女性,年龄3个月-8岁之间,平均年龄为(3.31±0.81)岁,病程7h-6d,平均病程(2.20±0.87)d。对比可知,两组患儿基础资料不存在统计学差异,有可比性(P>0.05)。

1.2 方法

对照组患儿接受头孢他啶(生产厂家:东北制药集团沈阳第一制药厂,批号文字:国药准字H10850004)进行治疗,0.9%氯化钠注射液+头孢他啶(50-100mg/kg)静滴,每日2次;研究组在头孢他啶基础上添加口服消旋卡多曲颗粒(生产厂家:江苏正大丰海制药有限公司,批号文字:国药准字H20051055)治疗,1.5mg/kg,每日3次,每组均接受1周的治疗,对比两组治疗效果。

1.3 临床观察指标

对比两组疗效:显效:经过相应的治疗,患儿临床症状全部消失,大便颜色、次数慢慢恢复正常;有效:治疗后,患儿临床症状有显著改善,大便次数有所减少,大便颜色逐渐恢复;无效:接受相应的治疗,患儿临床症状加重,大便颜色、次数并未出现改变^[2]。总有效率=显效率+有效率。详细记录并比较两组患儿所用止泻时间。

1.4 统计学分析

应用SPSS21.0软件展开统计学分析,以%、(x±s)表示计数、计量资料,用x²、t检验,若P<0.05,则差异有统计学意义。

2. 结果

2.1 对比两组临床效果

研究组与对照组患儿治疗总有效率依次为93.3%、70.0%,组间数据对比差异明显(P<0.05),如表1所示。

表1 比较研究组与对照组治疗总有效率(n, %)

分组	n	显效	有效	无效	总有效率
研究组	30	40.0(12/30)	53.3(16/30)	6.7(2/30)	93.3%
对照组	30	26.7(8/30)	43.3(13/30)	30.0(9/30)	70.0%
x ²					5.455
P					<0.05

2.2 比较两组患儿止泻情况

研究组患儿止泻时间明显早于对照组,差异有统计学意义(P<0.05),见表2。

表2 对比研究组与对照组止泻时间(x±s)

分组	n	止泻时间
研究组	30	48.50±18.94
对照组	30	72.28±20.11
t		4.715
P		<0.05

3. 讨论

腹泻是小儿消化系统较为常见的病症之一,大部分是因轮状病毒感染引起的疾病。加之,患儿因对外界抵抗力差,极易导致病毒、细菌入侵。腹泻患儿发病初期会出现腹泻、恶心、水样便等症状,严重影响患儿的身体健康及其生长发育情况^[3]。腹泻患儿临幊常给予抗病毒、维持电解质平衡等治疗,必要情况下加入少量抗生素,但治疗效果不理想。头孢他啶作为第3代头孢菌素,对于革兰氏阴性菌、肠杆菌属、肺炎链球菌等发挥着良好的抑制作用。消旋卡多曲是临床常用的一种选择性抑制剂,这种药物可以减少肠液在患儿肠腔积聚,达到缓解患儿临床症状,缩短疗程的目的。消旋卡多曲用于治疗腹泻患儿,不会影响患儿的中枢脑啡肽水平、肠道运动及物质转运功能,促使患儿获得满意的治疗效果^[4]。钱星星、欧燕兰等学者研究指出,反复腹泻患儿接受消旋卡多曲辅助治疗,不仅能改善患儿的炎症指标,也能缩短患儿止泻时间,减少患儿大便次数,促进患儿早日恢复健康^[5]。腹泻病患儿采用消旋卡多曲联合头孢他啶治疗,不仅可以缩短患儿腹泻总病程,也能提升临床治疗总有效率,促使患儿获得满意的治疗效果。本研究结果表明,研究组治疗总有效率为93.3%,对照组为70.0%,且研究组止泻时间比对照组早,差异存在统计学意义(P<0.05)。上述结果证实,腹泻患儿实施消旋卡多曲联合用药治疗,能有效缩短患儿止泻时间,对于提升临床治疗效果具有重要的意义。

总之,腹泻患儿行消旋卡多曲联合用药进行治疗,能有效提升临床治疗总有效率,改善患儿的临床症状,是一种值得在临幊上推广使用的治疗方法。

参考文献:

- [1]巩露,赵琳琳,封东进. 消旋卡多曲颗粒对感染性腹泻患儿的疗效及肠道微生态的影响[J]. 现代消化及介入诊疗, 2020, 25(4):503-506.
- [2]黄转弟. 消旋卡多曲辅助治疗急性腹泻患儿的效果分析[J]. 中国当代医药, 2020, 27(2):142-144.
- [3]王志刚. 探讨分析小儿腹泻应用消旋卡多曲治疗的临床效果[J]. 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), 2020, 20(33):120-121.
- [4]陈丽. 消旋卡多曲颗粒联合葡萄糖酸锌治疗小儿腹泻病的临床疗效观察[J]. 中国保健营养, 2019, 29(1):129-130.
- [5]钱星星,欧燕兰,曹姝平. 消旋卡多曲治疗儿童反复腹泻的效果及对炎症指标影响[J]. 中国处方药, 2020, 18(11):102-103.