

无缝隙护理在感染科发热待查患者中的应用分析

苟恩芳

(贵阳市乌当区人民医院 550018)

摘要:目的 分析感染科发热待查患者开展无缝隙护理的效果。方法 本次研究于2020年1月-2021年10月在本院进行,选择感染科发热待查患者68例为对象,按照随机单盲法分组,每组34例,对照组开展常规护理指导,观察组为无缝隙护理,分析效果。结果 观察组的护理满意度较对照组更高,有统计学意义($P < 0.05$)。结论 感染科发热待查患者开展无缝隙护理的优势比较明显,为治疗的顺利进展创造有利的条件,提升护理的满意度。

关键词: 感染科发热;无缝隙护理;满意度

发热待查是原因不明发热,持续超过2周,主要为感染性发热和非感染性发热,体温超过37.3摄氏度,长时间的高体温对患者造成的伤害比较明显,患者在一周内进行检查,但是无法确定具体原因的情况。感染待查患者多为发热患者,对身体健康影响较大。在近年来,患者的数量为增加趋势,在诊断上比较困难,患者和家属出现不良情绪,对患者非常不利,对患者的正常治疗不利,为此在重视有效护理服务的进展^[1]。无缝隙护理是将护理工作有效分离,开展有效的护理服务,在管理中,重视患者的中心地位,保证患者在治疗和康复中获取到有效的服务,保证护理的效果。本次实验主要分析无缝隙护理对感染科发热待查患者的影响,请看下述。

1 资料和方法

1.1 一般资料

选择我院在2020年1月-2021年10月期间68例感染科发热待查患者为对象,随机单盲法分组,每组34例。患者资料,对照组:男18例,女16例,年龄23-58岁,平均年龄(40.3±2.8)岁。观察组:男19例,女15例,年龄24-57岁,平均年龄(40.5±2.7)岁。基本资料对比无较大差异($P > 0.05$),符合比较标准。

1.2 方法

对照组为常规护理,接诊引导患者,需要急救患者,及时安排急救,做好相关的护理工作。

观察组为无缝隙护理,做好消毒隔离,对有呼吸道感染患者需要安排单人病房,发放口罩,告知患者佩戴口罩的重要性,辅助患者做好防护工作。(1)待查患者在进入到感染科后需要进行开展心理疏导,对患者和家属做出相应的安慰,尽可能地消除患者的恐惧、紧张等负面情绪,要重视和患者开展相应的交谈和观察,结合患者的具体情况,分析患者的心理状态等,针对患者的情况开展相应的健康宣教和指导。(2)观察患者是否需要抢救,在护理期间,需要至少3名护理人员在场,开展先救治然后付费的无缝隙服务,在接诊到患者后,先观察然后询问,开展初步的评估,进行准确分诊,送到目标诊室或抢救室,及时通知医生开展抢救,配合医生进行早期的体格检查等,对患者的病情进行进一步的评估。在抢救期间,护理人员要全程陪伴患者,动态分析患者的病情,在抢救的过程中,建立循环系统并进行检测。责任护士关注到患者生命体征的变化情况,小组长负责外勤,协助办理相关的手续,记录在抢救过程中出现的不良情况,在抢救过程中,需要保证分工准确,忙而不乱。(3)对留观的患者,需要做出细化和交接,在交接的过程中,开展路径化的控制,完善相关的管理制度、护理流程等,预先制定出应急预案。(4)细节无缝隙护理,护理人员要主动了解到患者的相关情况,关注到患者的病情和心理变化,给患者倒水等服务,让患者感受到被重视。重视患者的知情权和参与权,及时公示服务的内容、费用等,尽可能地满足患者的合理需求。对危重患者来说,每一项护理服务需要做出相应的报告,在交接班时,要做好相应的交接,讲述注意事项等内容。

1.3 观察指标

在护理服务结束后,患者和家属对护理服务做出满意度的评价,为非常满意、满意、不满意,计算护理满意度^[2]。

1.4 统计学分析

SPSS20.0软件数据分析,计数资料频数、百分率(%)描述, χ^2 检验。 $P < 0.05$ 有统计学意义。

2 结果

观察组的护理满意度高于对照组,有统计学意义($P < 0.05$)。详见表1。

表1 护理满意度[n(%)]

组别	例数	非常满意	满意	不满意	护理满意度
观察组	34	20	13	1	33 (97.06)
对照组	34	18	10	6	28 (82.35)
χ^2	/	/	/	/	3.981
P	/	/	/	/	0.046

3 讨论

在近些年的临床研究中,发热待查患者的数量在增加,患者因为发热原因不明确导致的疾病,发热对患者产生的伤害比较明显,舒适度下降,出现焦虑等不良情绪,对患者的正常治疗非常不利^[3]。为此要重视对患者开展相应的护理指导。

无缝隙护理服务对发热待查患者的影响比较明显,有效落实护理理念,重视患者的中心地位,结合患者的具体情况对患者开展相应的指导,做出合理的调整。无缝隙护理给患者提供更为全面的护理指导,做好病情监测等相关内容,开展有效的护理指导,减轻患者的不良情绪,而且组建护理小组开展护理指导,应变能力比较强,护理人员能做好自身的职责。在无缝隙护理中,患者和护理人员能构建良好的关系,落实相关的护理,改善彼此的关系,对患者的积极影响比较明显,能提升患者的生存质量,能有效地改善患者的心理状态^[4]。目前在临床中开展无缝隙护理服务,能提升护理的意义。无缝隙护理关注到患者的舒适情况,体现出护理内涵,让患者的身心处在舒适的状态,尤其是对感染科患者来说,病情多种多样,有效的护理提升治疗依从性和舒适度,同时也能构建良好的患者的管理体系,做好消毒防护隔离、基础护理等服务,转变被动的护理服务。

本次试验研究发现,观察组和对照组的护理满意度比较,有统计学意义($P < 0.05$)。

综上所述,感染科发热待查患者开展无缝隙护理的效果比较明显,为疾病治疗提供条件,提升患者的护理满意度。

参考文献:

- [1] 稽玮嘉,颜学兵.1838例发热待查患者临床特征[J].国际流行病学传染病学杂志,2019,46(3):185-189.
- [2] 田耕,王侠.炎症指标诊断发热待查感染性疾病的价值[J].武警医学,2020,31(1):26-29.
- [3] 刘晓光,曲昆,张秦.3例青少年发热待查的临床报告与护理体会[J].中国现代医生,2020,58(1):152-154.
- [4] 黄利华.门诊发热原因待查患者的临床特征与护理探讨[J].基层医学论坛,2019,23(18):140-141.

作者简介:姓名:苟恩芳,单位:贵阳市乌当区人民医院,籍贯:贵州遵义,学历:本科,民族:汉族,主管护师,从事护理专业