

综合护理干预应用于脑卒中继发癫痫的护理效果观察

韩玉华 王焕平

(莘县第三人民医院 山东聊城 252427)

摘要:目的:研究综合护理干预应用于脑卒中继发癫痫的护理效果。方法:选择本院在2020年3月份到2021年3月份之间所收治的脑卒中继发癫痫患者60例作为本文主要研究对象,将其分为两组,分别为对照组患者30例、观察组患者30例。对照组患者给予常规护理模式进行干预;观察组患者在常规护理干预之下给予综合护理展开护理。对比分析两组患者的护理效果以及生活质量。结果:对照组患者护理效果要比观察组患者护理效果差,二者之间差异有意义($P < 0.05$);两组之间生活质量进行比较,差异有意义($P < 0.05$)。结论:综合护理干预应用于脑卒中继发癫痫的护理效果十分显著,可以进一步提高患者的护理效果以及护理之后的生活质量,在临床护理之中值得推广。
关键词:综合护理;脑卒中继发癫痫;护理效果;生活质量

脑卒中属于临床之中的一种急性病,主要就是因为患者脑循环之中出现比较严重的障碍,而导致其大脑内部动脉出现破裂、闭塞等现象^[1]。这种急性病会促使患者身体健康受到严重影响,甚至会威胁到生命健康。在临床医学之中脑卒中通常有以下两种性状:第一是出血性、第二就是梗塞性^[2]。这两种形式的脑卒中患者都会出现很高病死率以及致残率。其中癫痫属于其中十分常见的一种并发症,导致患者整体生活质量出现下降。于是,本文主要选择本院在2020年3月份到2021年3月份之间所收治的脑卒中继发癫痫患者60例作为本文主要研究对象,分析综合护理干预应用于脑卒中继发癫痫的护理效果,现将调查研究结果作出以下有关报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择本院在2020年3月份到2021年3月份之间所收治的脑卒中继发癫痫患者60例作为本文主要研究对象,将其分为两组,分别为对照组患者30例、观察组患者30例。对照组患者年龄在56-78岁之间,患者年龄均值为(63.93 ± 3.28)岁。观察组患者年龄在55-80岁之间,患者年龄均值为(68.45 ± 3.91)岁。两组患者之间一般资料展开对比,差异无意义($P > 0.05$)。

1.2 方法

对照组患者给予常规护理,而观察组患者需要给予综合护理进行干预,主要内容为:

(1)护理人员需要针对患者展开定期的身体指标监测,针对患者的生命体征进行掌握,假如患者出现癫痫的预兆,那么需要及时将患者的头部偏向一侧,将压舌板在最短时间内放进患者的口腔内部,避免患者因为抽搐而出现咬舌的情况。(2)针对治疗和护理期间的患者,护理人员需要对其做到时刻的关注和监督,使得患者可以根据护理人员的要求按时服药。护理人员还需要对家属展开指导,使得患者家属起到对患者的监督作用,患者以及家属需要提

前知晓服用药物的不良反应,避免患者和家属受到影响而产生更多心理压力。(3)个性化护理。针对患者的实际病情展开充分了解,给予患者个性化护理以及服药指导,使得患者可以拥有针对性治疗和护理方案。(4)健康宣教。护理人员利用互联网技术针对患者展开健康宣教,可以促进患者进一步了解疾病的基本特点,并且为患者讲述一些成功治愈的病例,给予患者充分对抗疾病的信心。

1.3 观察指标

(1)对比分析两组患者的护理效果。

(2)对比分析两组患者的生活质量。

1.4 统计学方法

通过用SPSS17.0软件进行对数据的统计和整理,施以t值进行检验,两组之间计数的数据护理临床比表通过(%)表示,进行卡方检验, ($p < 0.05$),二者之间的差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 护理效果分析

观察组之中护理人员对于护理效果都比对照组高,而且两者之间的差异具有统计学意义($P < 0.05$), (如表1所示)。

表1 两组患者护理效果对比 (n/%)

组别	例数	有效	显效	无效	总有效率 (%)
观察组	30	26	2	2	93%
对照组	30	13	9	8	73%
χ^2 值					4.3200
P值					0.0376

2.2 生活质量分析。

经过对比,观察组患者生活质量分数更高,差异有意义($P < 0.05$),见表2。

表2 生活质量分数对比 ($\bar{X} \pm s$, 分)

组别	精神健康	情感职能	社会功能	躯体功能	生理功能
对照组 (n=30)	73.77 ± 5.53	65.53 ± 3.12	65.46 ± 5.12	75.50 ± 6.12	75.13 ± 5.12
观察组 (n=30)	78.78 ± 6.23	68.28 ± 3.25	71.53 ± 5.65	80.33 ± 5.23	80.33 ± 5.41
T	3.2941	3.3433	4.3604	3.2862	3.8237
P	0.0017	0.0015	0.0001	0.0017	0.0003

3 讨论

脑卒中属于临床心脑血管疾病之中十分高发的一种疾病,经常见于老年群体,这一疾病在临床之中的表现主要就是肢体出现障碍,单侧肢麻木等,患者还会出现说话不清楚等现象^[3]。根据相关研究表明,脑卒中患者在发病之后,假如没有接受及时治疗就会导致其出现十分严重的并发症继发癫痫,这会对患者的身体健康带来严重威胁,具有很高致残率以及死亡率^[4]。于是,本文主要选择本院在2020年3月份到2021年3月份之间所收治的脑卒中继发癫痫患者60例作为本文主要研究对象,分析和调查综合护理对患者护理效果以及生活质量的影响^[5]。对照组患者护理效果要比观察组患者护理效果差,二者之间差异有意义($P < 0.05$);两组之间生活质量进行比较,差异有意义($P < 0.05$)。

总而言之,综合护理干预应用于脑卒中继发癫痫的护理效果十分显著,可以进一步提高患者的护理效果以及护理之后的生活质量,在临床护理之中值得推广。

参考文献:

- [1]李小亚. 综合护理干预应用于脑卒中继发癫痫的护理效果观察[J]. 黑龙江中医药,2020,49(04):391-392.
 - [2]董冰心. 综合护理干预应用于脑卒中继发癫痫的效果观察[J]. 山东医学高等专科学校学报,2020,42(03):223-224.
 - [3]李杰. 综合护理干预应用于脑卒中继发癫痫的护理效果分析[J]. 黑龙江中医药,2020,49(01):200-201.
 - [4]景丽. 综合护理干预应用于脑卒中继发癫痫的护理效果[J]. 中国医药指南,2020,18(04):188-189.
 - [5]王丽. 综合护理干预应用于脑卒中继发癫痫的护理效果观察[J]. 临床医药文献电子杂志,2019,6(84):120-121.
- 作者简介:韩玉华,女,汉族,籍贯:山东省聊城市莘县观城镇东街村,生于:1977-06,工作单位:莘县第三人民医院,学校:潍坊医学院,单位省市:山东省聊城市,单位邮编:252427 职称:主管护师,本科学历 研究方向:内科护理学