

急诊急救护理对门诊输液患者突发病情变化的影响

吴世美

(铜陵市第五人民医院 安徽铜陵 244100)

摘要:目的:分析门诊输液患者突发病情变化时,急诊急救护理对其产生的影响。方法:研究筛选出对照组和观察组一共80例发生突发病情变化的门诊输液患者为对象,都于2019年10月至2021年10月进入本院治疗,以平行对照法为原则分组,分为两组。对照组患者实行常规护理模式,观察组患者采用急诊急救护理,最后对护理满意度和不良输液发生率进行对比。结果:对2组门诊输液患者不良输液发生率和护理满意度数据进行对比后,观察组数据明显高于对照组,对比具有统计学意义($P < 0.05$)。结论:对门诊输液患者突发病情变化时实施急诊急救护理,能够有效地提高患者满意度,降低不良输液发生率,值得在临床推广。

关键词:急诊急救护理;突发病情;门诊输液患者

门诊在医院各个部门中占据着非常重要的位置,输液更是一种非常常见的治疗手段。门诊输液患者病情种类复杂,发生突发病情变化的概率比较高。门诊输液患者出现突发病情变化时,需要医护人员采取及时、有效、科学的护理干预手段,保障患者的生命健康和生命安全,提高患者的疾病治疗效率^[1]。鉴于此,本次实验选取了2019年10月至2021年10月在我院就诊的发生突发病情变化的门诊输液患者,入选的患者共80例。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

研究筛选出对照组和观察组一共80例发生突发病情变化的门诊输液患者为对象,包括10例过敏性休克,15例晕针,22例低血糖,2例呼吸困难,2例脑血管意外,29例输液反应。都于2019年10月至2021年10月进入本院治疗,以平行对照法为原则分组,分为2组。对照组40例患者,男女例数各计27例与13例,年龄在15岁~70岁,中间值(42.16 ± 6.34)岁,病程1~15d,中间值(5.78 ± 0.94)d。观察组年龄在14~71岁,中间值(44.23 ± 4.34)岁,男女例数各计25例与15例,病程1~14d,中间值(5.05 ± 0.82)d。客观比较患者的年龄、性别、病程时长等资料,无显著差异,达到研究标准。

1.2 实验方法

1.2.1 对照组实行常规护理模式,密切关注患者的病情变化,出现特殊变化时,及时通知医生,采取及时有效的干预措施。

1.2.2 实验组在原有基础上增加急诊急救护理,根据患者的实际情况制定个性化急救护理方案。①低血糖患者护理方法:对于这类患者需要加强对头晕、四肢无力、恶心等相关症状的关注,一旦出现意识模糊、脉搏微弱等情况,应立即帮助患者平卧,并询问患者的饮食情况和家族病史,根据实际情况,叮嘱患者饮用温糖水,观察患者的血糖水平变化。②过敏性休克先兆患者护理方法:先帮助患者平卧位姿势,避免来回搬动患者,积极稳定患者的情绪,预防较大的波动,再给予吸氧,并对脉搏、血压、心率等密切监测,防止患者出现休克的情况。③心理干预:患者受疾病、治疗效果等因素的影响,会出现一定程度的焦虑、紧张情绪。护理人员应该细心地关注患者的情绪,主动与患者沟通交流,进行心理上的开导,保证患者与医护之间的交流,保证医疗质量。

1.3 评价标准

比较2组门诊输液患者不良输液发生率(包括局部肿胀、针头阻塞等情况)和护理满意度数据。护理满意度由患者出院后做出客观评价,程度分为:①非常满意,②满意,③基本满意,④不满意。满意率=(非常满意+满意)/总人数 $\times 100\%$ 。

1.4 统计方法

应用SPSS18.0软件进行数据的统计分析,以均数 \pm 标准差($\bar{x} \pm s$)进行描述,两组间比较采用t检验,计数资料以例(%)进行描述,采用 χ^2 检验, $P < 0.05$ 提示差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 2组门诊输液患者不良输液发生率

就2组门诊输液患者不良输液发生率数据中看,观察组明显高于对照组($P < 0.05$)。(见表1)

表1 两组门诊输液患者不良输液发生率[n(%)]

组别	局部肿胀	针头阻塞	发生率
对照组(N=40)	5(12.50)	3(7.50)	8(20)
观察组(N=40)	0(0.00)	1(2.50)	1(2.50)
X^2			5.031
P			0.015

2.2 2组门诊输液患者护理满意度

就2组门诊输液患者护理满意度数据来看,观察组明显高于对照组($P < 0.05$)。(见表2)

表2 两组门诊输液患者护理满意度

组别	非常满意	满意	基本满意	不满意	满意率
对照组(N=40)	25	4	6	5	72.5%
观察组(N=40)	29	6	3	2	87.5%
X^2					3.202
P					0.031

3 讨论

输液相较于口服用药,药效起效快,治疗效果更显著。受患者的个人体质、病史、输液血管位置以及护理人员的专业技术水平影响,使得在输液过程中不可避免地出现突发情况,会给患者的生命健康带来巨大的威胁。再加上门诊输液患者病情种类复杂,病种繁多,人流量大,给护理人员的工作也带来了很大的压力^[2]。考虑到以上种种情况,就需要在门诊输液患者护理中应用急诊急救护理。

急诊急救护理是一项包含护理决策、护理方式、急救手段等一体的系统实践,不仅要求护理人员要时刻关注患者的病情发展,做好并发症的预防工作,还要注意患者的情绪变化,做好对健康知识的宣讲和普及,帮助患者缓解焦虑紧张情绪,减少病情突变事件的发生率。要加大警示教育,对护理过程的薄弱环节,重点监督,避免在薄弱环节上出现问题;出现不良事件后,第一时间对事件做详细分析,找出原因,查漏补缺^[3]。本研究结果显示,通过两种不同护理手段后两组患者的不良输液发生率和护理满意度,观察组高于对照组。

综上所述,在门诊输液患者突发病情变化时,应用急诊急救护理,能够有效地降低患者不良输液率的发生,提高患者的护理满意度。

参考文献:

- [1] 严波,周薇.急诊急救护理服务对输液患者突发病情变化的处理效果[J].中国社区医师,2021,37(33):134-135.
- [2] 温宏,蔡红梅,徐武兵.急诊急救护理对门诊输液患者突发病情变化的影响分析[J].实用临床护理学电子杂志,2020,5(21):5.
- [3] 张亚芸,刘黎.急诊急救护理对门诊输液患者突发病情变化的有效分析[J].世界最新医学信息文摘,2018,18(79):285+292.