

针对性护理对降低乙肝患者静脉留置针使用穿刺部位并发症发生率的影响分析

张蓉

(重庆医科大学附属第二医院 感染病科 重庆市 400000)

摘要:目的 针对性护理对降低乙肝患者静脉留置针使用并发症发生率的影响。方法 随机选取 2021 年 1 月至 2021 年 7 月收治的 100 例乙肝患者并行静脉留置针穿刺者作为研究对象, 根据护理方式的不同将其分为对照组及试验组, 其中对照组 50 例患者采用常规护理干预, 试验组 50 例患者采用针对性护理干预, 对两组患者的相关指标进行对比分析。结果 对两组患者的并发症发生率进行对比发现, 试验组的并发症发生率明显低于对照组, 差异明显 ($P<0.05$); 对两组患者的护理满意度进行对比发现, 对照组中十分满意 21 例, 满意 15 例, 护理满意度为 72%; 试验组中十分满意 28 例, 满意 16 例, 护理满意度为 88%, 对比发现, 试验组患者的护理满意度明显高于对照组, 差异明显 ($P<0.05$)。结论 对于乙肝患者使用静脉留置针, 采用针对性护理干预的方式, 能够有效降低患者的穿刺部位的并发症发生率, 提高患者的护理满意度, 具有较高的临床应用价值。

关键词: 针对性护理; 静脉留置针; 乙肝患者; 并发症

乙肝是乙型病毒性肝炎的简称, 病毒性肝炎的一种类型, 以肝脏损害为主的一种全身性传染病, 随着病程发展, 可发展为肝硬化、原发性肝癌、肝衰竭, 需要长期反复住院治疗并行静脉输液, 采用静脉留置针来对患者进行输液治疗, 这样的一种方式能够减少患者反复穿刺的痛苦, 降低对患者血管的伤害^[1]。不过, 这样的方式可能会引起一些并发症情况, 患者常常对留置针有所排斥。基于此, 本文将随机选取 2021 年 1 月至 2021 年 7 月收治的 100 例行静脉留置针乙肝患者作为研究对象, 分析针对性护理对改善静脉留置针乙肝患者穿刺部位并发症发生的效果。

1 资料与方法

1.1 基本资料

随机选取 2021 年 1 月至 2021 年 7 月收治的 70 例行静脉留置针乙肝患者作为研究对象, 根据护理方式的不同将其分为对照组及试验组, 其中对照组 50 例患者中男女比例为 26: 24; 年龄在 33 岁至 72 岁之间, 平均年龄为 (46.11 ± 3.29) 岁, 试验组 50 例患者中男女比例为 27: 23; 年龄在 34 岁至 72 岁, 平均年龄为 (46.23 ± 3.28) 岁, 组间资料对比, 差异明显 ($P<0.05$)。

1.2 方法

对照组: 行常规护理干预。

试验组: 行针对性护理干预, 其主要内容如下: ①组建针对性护理小组, 小组成员由经验丰富的医护人员组成, 对静脉留置针可能出现的一些风险因素进行积极的评估, 并制定出有效的防范及干预措施。②建立《留置针使用观察记录表》挂于床头, 每班评估并记录。③健康宣教, 根据患者的受教育程度以及接受能力, 采用对应的方式让患者能够了解疾病的相关知识, 同时可以通过相关知识讲座的方式, 加深患者与医护人员的交流, 对患者产生的心理顾虑进行解答。④患者在输液期间, 需要提高病房的巡视工作, 当患者出现异常情况时能够及时的进行处理^[2]。

1.3 观察指标

对两组患者的并发症情况以及护理满意度进行对比分析。

1.4 统计学方法

SPSS25.0 处理计数 (χ^2) 和计量 (t) 资料, 差异显著 ($P<0.05$)。

2 结果

2.1 两组并发症发生率对比

对两组患者的并发症发生率进行对比发现, 对照组中静脉炎发生 4 例, 药物渗出 1 例, 导管堵塞 1 例, 并发症发生率为 12%; 试验组中静脉炎以及药物渗出 1 例, 并发症发生率为 4%, 试验组的并发症发生率明显低于对照组, 差异明显 ($P<0.05$)。

表 1 两组并发症发生率对比(%)

组别	例数	静脉炎	药液渗漏	导管堵塞	并发症发生率
对照组	50	4 (8)	1 (2)	1 (2)	6 (12)
试验组	50	1 (2)	1 (2)	0 (0.00)	2 (4)
χ^2					4.200
P					0.040

2.2 两组患者护理满意度对比

对两组患者的护理满意度进行对比发现, 对照组中十分满意 21 例, 满意 15 例, 护理满意度为 72%; 试验组中十分满意 28 例, 满意 16 例, 护理满意度为 88%, 对比发现, 试验组患者的护理满意度明显高于对照组, 差异明显 ($P<0.05$)。

表 2 两组患者护理满意度对比(%)

组别	例数	十分满意	满意	不满意	满意度
对照组	50	21 (42)	15 (30)	14 (28)	36 (72)
试验组	50	28 (56)	16 (32)	6 (12)	44 (88)
χ^2					4.000
P					0.045

3 讨论

对于乙肝患者的治疗需要做好对应的治疗准备, 通过输液治疗的方式能够使得药物直接输送到患者体内, 发挥出良好的药效, 通过静脉留置针的方式能够简化患者的治疗流程, 不过也需要配合对应的护理干预, 降低并发症的发生几率^[3-4]。根据本文研究结果显示: 对两组患者的并发症发生率进行对比发现, 试验组的并发症发生率明显低于对照组, 差异明显 ($P<0.05$); 对两组患者的护理满意度进行对比发现, 对照组中十分满意 21 例, 满意 15 例, 护理满意度为 72%; 试验组中十分满意 28 例, 满意 16 例, 护理满意度为 88%, 对比发现, 试验组患者的护理满意度明显高于对照组, 差异明显 ($P<0.05$)。从以上数据能够发现, 借助针对性护理的方式能够很好的改善患者的预后效果。

综上所述, 对于乙肝患者静脉留置针, 采用针对性护理干预的方式, 能够有效改善患者的穿刺部位的并发症发生率, 提高患者的护理满意度, 具有较高的临床应用价值。

参考文献:

- [1] 胡娟娟. 针对性护理干预对慢性乙肝抗病毒治疗患者自我管理能力的影 响 [J]. 大家健康旬刊, 2017, 11 (1): 241 - 242.
- [2] 曾海燕, 张艳红, 孙妙艳. 项目管理在降低浅静脉留置针导管回血发生率中的应用 [J]. 广州医科大学学报, 2019, 47(4): 130 - 132.
- [3] 叶森娣, 舒香云, 戴雯, 等. 生理盐水在浅静脉留置针封管中的应用 [J]. 护理实践与研究, 2014, 22(6): 132 - 133.
- [4] 张艾灵, 陈竹所. 老年患者浅静脉留置针留置失败原因分析及对策 [J]. 西南国防医药, 2012, 22(9): 1014 - 1015.