

优化急诊护理流程对提升急性脑卒中抢救成功率的影响分析

潘苗

(溧阳市人民医院 江苏溧阳 213300)

摘要:目的:优化急诊护理流程对提升急性脑卒中抢救成功率的影响分析。方法:实验于2021年4月-2022年4月期间选择100例因急性脑卒中而就诊于我科室的病人进行调研,入组病人在调研期间搭配护理干预。按照护理举措进行分组,每组均纳入50例病人,分别命名为常规组与研究组。常规组在本次调研中所采用的护理方案为传统常规护理,研究组则采用护理方案为优化急诊护理流程。总结与探究2种护理方案实施效果。结果:常规组抢救成功率为84%明显低于研究组的98%,经对照,差异明显, ($P<0.05$)。结论:优化急诊护理流程在提高急性脑卒中抢救成功率中的效果优异,此方案值得临床应用与普及。

关键词:优化急诊护理流程;急性脑卒中;抢救成功率;

急性脑卒中在临床治疗中属于常见且多发病,此疾病具备发病率高的特点,据临床不完全收集与统计资料证实,最近几年急性脑卒中发生率呈逐年增高趋势。急性脑卒中在临床治疗中以对症治疗为主,但由于疾病存在特殊性,大多数病人具备起病急、病情进展速度快的特点,而且病死率、致残率高,给病人生命安全、治疗带来影响。基于上述情况,我科室搭配了护理干预,即为优化急诊护理流程与传统常规护理,为了总结与探究2种护理方案实施效果,于2021年4月-2022年4月期间选择100例因急性脑卒中而就诊于我科室的病人进行调研,具体实施情况如下。

1. 资料与方法

1.1 一般资料

实验于2021年4月-2022年4月期间选择100例因急性脑卒中而就诊于我科室的病人进行调研,入组病人在调研期间搭配护理干预。按照护理举措进行分组,每组均纳入50例病人,分别命名为常规组与研究组。常规组: $n=50$ 例,年龄在45岁至66岁之间,中位年龄为55.25岁。研究组: $n=50$ 例,年龄在46岁至66岁之间,中位年龄为55.32岁。本次实验均在病人以及其家属知情且同意情况下进行,所有患者的基本资料对比,差异无统计学意义($P>0.05$)。参与本次调研病人除急性脑卒中外,不患有其他疾病。

1.2 实验方法

常规组在本次调研中所采用的护理方案为传统常规护理,即为疾病基础护理。

研究组则采用护理方案为优化急诊护理流程,具体如下:(1)优化接诊流程:评估急救方面的科学性、合理性,接到120急救电话后,确定任务量,以来电者对病人的描述情况为依据,指导其进行现场简单护理,保证患者正确体位,随时保持电话联系。(2)对救治流程进行优化:到急救护理小组成员需要与医生协助配合初步诊断患者病情,再转往急诊期间密切观察病人生命体征,安排专门看护人员进行急救,准确评估疾病情况,做好抢救物品准备工作,同时检测病人生命体征改变。(3)优化术后护理:根据病人实际情况营造舒适、安静的休息环境,保证充足休息以及睡眠。

1.3 评价标准

本次实验总结护理结果。从抢救成功率进行对照,采用抢救成功例数、抢救未成功例数,计算抢救成功率。

1.4 统计学方法

对结果进行讨论,使用统计学软件SPSS 19.0处理数据,正态计量数据用“ $\text{Mean} \pm \text{SD}$ ”表示,计数资料采用例数或百分比表示,正态,方差齐资料组间比较采用t检验,样本率的比较采用卡方检验, $P<0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

常规组: $n=50$ 例病人,抢救成功例数/42例,抢救成功率为42/50(84%);研究组: $n=50$ 例病人,抢救成功例数/49例,抢救成功率为49/50(98%),常规组抢救成功率为84%明显低于研究组的98%,经对照,差异明显, ($P<0.05$)。

3 讨论

急性脑卒中在临床治疗中属于常见且多发病,此疾病具备发病率高的特点,一旦发生将给病人生命安全造成严重的威胁与影响。急性脑卒中在临床治疗中以对症治疗为主,以护理干预为辅,有效的护理干预可提高治疗效果,改善临床症状,通常情况下,临床常用护理方案为传统常规护理,这种护理方案虽然有效,但作用不太理想。基于上述情况,我科室采用了优化护理举措。优化护理举措属于新型护理方案,这种护理方案在实施期间可弥补传统常规护理方案的不足之处,通过可保留其优势。通过优化接诊流程,可细化护理接诊流程,使病人在最短时间内得到救治。再搭配救治流程进行优化,可缩短抢救等待用时,为抢救争取到最为宝贵的时间。再搭配术后护理,可提高护理质量,降低并发症发生率。

本次调研结果证实,常规组抢救成功率为84%明显低于研究组的98%,经对照,差异明显, ($P<0.05$) ,此结果充分表明研究组所采用护理方案的优越性,可提高抢救成功率。

综上所述,优化急诊护理流程在提高急性脑卒中抢救成功率中的效果优异,此方案值得临床应用与普及。

参考文献

[1]胡品军,吴莉敏,黄云苑,等. 优化急诊护理流程对急性缺血性脑卒中溶栓患者诊治的影响[J]. 岭南急诊医学杂志,2021,26(2):199-201.

DOI:10.3969/j.issn.1671-301X.2021.02.033.

[2]习慧. 研究优化急诊护理流程在抢救急性缺血性脑卒中患者中的应用价值[J]. 临床医药文献电子杂志,2019,6(5):100,104. DOI:10.3877/j.issn.2095-8242.2019.05.087.

[3]李敏. 优化急诊护理流程对急性缺血性脑卒中救治效果的影响[J]. 中国社区医师,2021,37(8):137-138. DOI:10.3969/j.issn.1007-614x.2021.08.066.

[4]罗金艳. 优化急诊护理流程对提升急性脑卒中抢救成功率的影响分析[J]. 医学理论与实践,2019,32(9):1414-1415. DOI:10.19381/j.issn.1001-7585.2019.09.075.

[5]许晓莉,乐彦赞. 急诊护理流程优化对急性出血性脑卒中患者救治效果的影响[J]. 齐鲁护理杂志,2018,24(16):113-115. DOI:10.3969/j.issn.1006-7256.2018.16.047.