

# 全面护理方式对小儿癫痫护理工作的影响分析

林莉莉

(贵州省黔南州中医医院儿科住院部十楼 贵州 黔南州 558000)

**摘要:**目的 分析在对小儿癫痫患儿进行护理的过程中将全面护理干预进行运用的作用。方法 研究在 2021 年 2 月至 12 月展开, 选入该时间段我院收治患儿中的 60 例为对象, 并进行 1 至 60 编号, 取其中的 30 例, 在治疗过程中展开常规性护理, 作为对照组, 在对剩下患儿进行护理的过程中则将全面护理干预进行运用, 作为观察组。分析干预效果。结果 结合对两组患儿癫痫发作频率、家属护理满意度以及住院时间进行统计, 观察组均存在优势,  $P < 0.05$ 。结论 在对小儿癫痫患儿进行护理的过程中将全面护理干预进行运用, 可以有效提升临床对该部分患儿的护理效果, 达到帮助患儿进行恢复的目的。

**关键词:** 全面护理; 小儿癫痫

小儿癫痫属于临床最为常见的病症类型, 对患儿健康所造成的影响较大。且结合临床近几年的实际接诊情况可见, 在多方面因素的作用下, 小儿癫痫患儿的数量存在有明显上升的趋势<sup>[1]</sup>。在临床治疗的过程中, 为促使患儿对应症状可以迅速得到改善, 更需要做好对应的护理工作。本次研究就主要对全面护理干预在该部分患儿护理中的作用进行分析。

## 1 资料与方法

### 1.1 一般资料

研究在 2021 年 2 月至 12 月展开, 选入该时间段我院收治患儿中的 60 例为对象, 并进行 1 至 60 编号, 取其中的 30 例, 在治疗过程中展开常规性护理, 作为对照组, 在对剩下患儿进行护理的过程中则将全面护理干预进行运用, 作为观察组。在患儿组成方面, 对照着中存在有男性患儿 18 例, 女性患儿 12 例, 年龄分布在 2—12 岁间, 均值为  $(6.23 \pm 1.02)$ 。而观察组中则包括有男性 17 例, 女性 13 例, 年龄分布在 1—11 岁间, 均值为  $(6.11 \pm 1.23)$ 。对比以上数据,  $P > 0.05$ 。

### 1.2 方法

对照组患儿在恢复的过程中对应的护理工作都按照常规护理形式进行展开。护理人员需要仔细评估患儿在恢复过程中各方面生命指标的变化情况, 及时分析是否出现异常, 并耐心为患儿家属讲解在患儿恢复过程中需要注意的问题等。在对观察组患儿进行护理的过程中则需要将全面护理干预进行运用: (1) 护理方案制定。为确保可以为患儿在恢复的过程中提供最为全面的护理干预, 护理人员需要对患儿的各方面情况进行综合性评估, 了解患儿的病症严重程度以及治疗进展、日常生活习惯以及爱好等, 确保可以为患儿提供最为舒适的护理干预。(2) 细化常规护理。在对该部分患儿进行护理的过程中, 护理人员需要做好患儿的体位护理工作, 促使患儿处在最舒适的体位。同时, 更需要对患儿口腔以及鼻腔的分泌物及时清理, 确保患儿呼吸道处在畅通的状态。在患儿出现癫痫症状时则需要及时使用压舌板, 避免患儿咬伤自己的舌头。且需要做好患儿的看护工作, 以防出现坠床等情况。(3) 心理干预。在病症的作用下, 患儿会存在有焦虑、紧张、躁动等情况, 会在一定程度上影响到自身恢复。护理人员则需要结合患儿的年龄以及认知情况等做好对应的心理疏导工作, 促使患儿在恢复的过程中可以保持较为乐观的心理。(3) 饮食干预。该部分患儿日常饮食需要清淡、容易消化食物为主, 可以适当增加对新鲜水果、蔬菜的摄入, 达到补

充维生素, 提升患儿免疫力的作用, 对于促进患儿恢复同样存在有重要的作用。

### 1.3 观察指标

研究过程中需要对两组患儿癫痫发作频率、家属护理满意度以及住院时间进行统计。

### 1.4 统计学方法

研究中的对应数据都借助 SPSS20.0 进行处理, 按照百分数对计数数据进行表示, 卡方检测, 对应计量数据则按照均值  $\pm$  标准差进行表示,  $t$  检测,  $P < 0.05$  差异具备统计学意义。

## 2 结果

在癫痫发作频率上, 观察组为  $(1.82 \pm 0.12)$  次/周, 对照组则为  $(3.11 \pm 0.34)$  次/周, 对比  $t=10.872$ ,  $P=0.001 < 0.05$ 。在家属护理满意度上, 观察组为 96.67% (29/30), 对照组则为 80.00% (24/30), 对比  $t=8.872$ ,  $P=0.001 < 0.05$ 。在住院时间上, 观察组为  $(7.11 \pm 0.41)$  天, 对照组则为  $(10.02 \pm 1.22)$  天, 对比  $t=14.772$ ,  $P=0.001 < 0.05$ 。

## 3 讨论

癫痫属于儿科最为常见的病症, 对患儿健康造成的负面影响较大。在临床治疗的过程中, 为促使患儿癫痫症状可以迅速得到改善, 更应当做好对应的护理工作。在降低癫痫发作频率的基础上, 促进患儿进行恢复<sup>[2-3]</sup>。

将全面护理干预运用到对该部分患儿护理的过程中, 结合患儿的病症特点, 为患儿在治疗的过程中展开最为全面的护理干预, 从细化常规护理、心理干预以及日常饮食等多个层面实施干预, 促使患儿癫痫症状得到有效改善, 达到促进患儿恢复的目的。结合对比护理可见, 以全面护理干预护理的观察组患儿恢复情况明显优于对照组, 充分证实了该护理模式的有效性。

总之, 在对癫痫患儿进行护理的过程中可以将全面护理干预进行运用。

### 参考文献:

- [1]王蕾. 全面护理方式对小儿癫痫护理工作的影响探究[J]. 实用临床护理学电子杂志, 2020,90(2):2.
- [2]刘玲. 综合护理干预在小儿癫痫患者护理中的应用效果及满意度影响分析[J]. 心理月刊, 2020,7(7):1.
- [3]陈颖利, 吴静, 朱晓辉. 整体护理对小儿脑损伤继发癫痫患儿复发率的影响[J]. 贵州医药, 2020,22(12):12.