

几种易混淆中药饮片的性状鉴别要点探讨

杨丽娟

(丰都县社坛中心卫生院 408203)

摘要: 良好的医学储备是医生在临床诊疗中的重要基础, 医生在开具处方中需要结合患者的具体病因、辩证分型等方面的特点, 同时也要考虑到药材之间有无配伍禁忌。中药饮片是中医治疗的重要药物, 但是中药饮片中存在很多容易混淆的药材, 如果配伍不当, 不但影响治疗效果, 甚至引起较多的不良反应, 危害患者的健康安全, 造成医疗事故。因此文章主要针对几种容易混淆的中药饮片性状鉴别要点展开探讨。

关键词: 中药饮片; 性状鉴别; 药物管理

中药饮片种类繁多, 采取的鉴定方法也有很多种, 常见的有性状鉴定、基源鉴定、理化鉴定等。其中性状鉴定由于操作简单, 在实际应用中的范围较广。通常来说, 按照《中国药典》、《中药饮片炮制标准》中的标准, 工作人员可以根据自身的专业知识与工作经验对中药饮片进行鉴别^[1]。但是中药饮片中存在一些容易混淆的药材, 在性状鉴别时容易出现差错, 因此需要对比较容易混淆的中药饮片的性状鉴别要点进行总结与分析。

一、根茎类中药饮片的性状鉴别要点

①半夏与水半夏: 半夏与水半夏虽然同属于天南星科植物, 但是两种药物有一定的相似之处, 半夏性温味辛, 具有降逆止呕、消痞散结的功效, 多用于痰多咳嗽、风痰眩晕等疾病的治疗中, 而水半夏性温味辛, 具有化痰止咳燥湿的功效, 多用于痰多咳嗽、支气管炎的治疗中。从外观来看, 半夏多为类球状, 有些半夏的顶端存在凹陷, 下段外壁平滑; 而水半夏的整体规格要更小, 其两端更尖, 断面颜色也比半夏更重。②人参与商陆: 人参与商陆在外观上非常相似, 但是商陆外观存在罗盘纹, 也就是与年轮相似的同心圆环纹, 其质地相比于人参要更加坚硬。人参顶端存在须根, 且颜色多为棕黄色, 气味比商陆更香甜^[2]。③何首乌、红药子: 何首乌外部颜色多为红棕色, 外部有云锦状的花纹, 断面存在层环; 而红药子外部颜色相对更深, 多为深红色或紫褐色, 断面无花纹, 并且髓部存在维管束是红药子的典型征象。④木香、川木香: 木香与川木香在外观上有较高的相似度。木香多为类圆柱形, 生药材多为棕色, 炮制后的木香多为棕黄色或者是灰棕色, 表面凹凸不平、有沟壑与皱裂, 味道苦。川木香的外观多为圆柱形, 表面颜色多为深褐色, 表面有网状的纤维束, 且质地易脆, 容易被折断。⑤香附与大香附: 香附与大香附在外观上有较高的相似度, 大香附也被称为咸香附。香附的直径多 < 1cm, 长度在 2.0~3.5cm, 表面多为棕褐色、黑褐色, 部分香附有棕色毛须; 大香附的直径相对更大, 直径与长度都要更高, 节间分布较多的环节^[3]。

二、茎木类中药饮片的性状鉴别要点

①关木通、川木通: 关木通多为浅棕黄色, 外壁有褶皱、凹凸不平, 其横断面的颜色要比外观更浅, 横断面可观察到导管小孔以及白色的脉络线, 气味腥臭。川木通的颜色多为黄棕色, 其髓部多为黄棕色或白色, 部分川木通为中空的。②大血藤、鸡血藤: 大血藤与鸡血藤在外观上有较多的相似之处, 尤其是颜色, 同为棕色。大血藤横断面颜色多为棕红色, 断面平整, 可观察到导管小孔以及红棕色的纹理, 纹理多为花状。鸡血藤的颜色相对更深, 内部颜色多为红褐色, 导管排列不规则, 其主要特征为内侧会出现黏液, 断面粗糙。③泽泻、三棱: 泽泻从外观来看, 多为类圆形、长圆形, 表面为黄白色或黄棕色, 有较多细小的根须; 三棱则多为圆锥形,

颜色多为黄色、灰黄色, 质地坚硬, 咀嚼可感到口麻^[4]。

三、皮类中药饮片的性状鉴别要点

①五加皮、香加皮: 五加皮与香加皮的名称与外观有着较高的相似度, 但是药用价值却有较大的差异, 因此在中药饮片管理中需要做好鉴别与区分工作。香加皮与五加皮的外观均为空心圆筒状, 香加皮的厚度更高但质地较脆, 容易脱落片状物, 其断面粗糙且香气扑鼻; 五加皮表面存在较多的皮孔, 且断面平整。②肉桂、柴桂: 肉桂是指肉桂的干燥树皮, 但是经常会被一些不法分子使用柴桂来冒充。肉桂断面粗糙且有颗粒感, 表面为红棕色, 内部为红棕色; 柴桂多为深棕色, 断面有凌乱分布的黄白色斑点^[5]。

四、果实种子类中药饮片的性状鉴别要点

①北五味、南五味: 北五味相比于南五味的规格要更大, 外观多为暗红色或紫红色, 果肉要厚于南五味; 南五味的果实小且表面多为暗红色或棕褐色, 皮薄肉少。②桃仁、杏仁: 桃仁外观扁平、边缘窄且味道苦; 杏仁相比于桃仁要更厚, 顶端更尖且味道更苦。③栀子、水栀子: 栀子多为椭圆形且梗短, 果皮薄且脆; 水栀子多为长椭圆形, 规格相对更大且果皮较厚。中医治疗中讲究辨证治疗, 需要根据患者的病因、病症辨证治疗, 对于药材的处理也有明确的要求, 如果在配方中混淆了药材, 不但会影响患者的治疗效果, 还会引起较多的毒副作用, 加上很多人在利益的驱使下, 以次充好、售假卖假, 因此需要加强中药饮片的管理, 不断提高自身的知识储备, 避免混淆中药饮片的情况发生, 确保患者治疗治疗的效果, 减少药物不良反应, 从而推动中医治疗的可持续发展。

结束语

中药饮片作为中医治疗的常用药物, 为了确保其应用效果, 需要做好性状鉴别, 避免药物不良反应的发生。但是在实际应用中, 有些不法分子使用容易混淆的药材来冒充, 导致各种问题的出现, 为了预防这一情况, 需要对容易混淆的中药饮片性状鉴别要点进行总结, 从而为实际工作提供有效的指导, 预防医疗事故的发生。

参考文献

- [1] 苗婷, 李欣. 中药调剂中易混淆中药饮片的鉴别方法研究[J]. 中国保健营养, 2021, 31(19): 79.
- [2] 王亚军. 微性状鉴别法对提高易混淆中药饮片鉴别准确性的探讨[J]. 中国民族民间医药, 2020, 29(16): 48-50, 59.
- [3] 李华, 李志强. 探讨中药调剂中易混淆中药饮片鉴别方法[J]. 世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), 2018, 18(36): 161.
- [4] 杨秋菊. 中药调剂中易混淆中药饮片的鉴别方法分析[J]. 中国保健营养, 2021, 31(24): 274.
- [5] 谭廉清, 周美琴, 曾剑澜. 常见 3 组易混淆中药饮片的快速鉴别与临床应用比较[J]. 中国中医药现代远程教育, 2021, 19(1): 53-55.